

FICHA TÉCNICA

CIRCUMVENT® PCV
Vacuna subunitaria Circovirus Porcino Tipo 2
Suspensión Inyectable

Composición:

Cada dosis contiene:

Antígeno subunitario ORF2, Circovirus Porcino tipo 2, Cepa MSV-BAC7PCV2-ORF2; 98-99 1.2 ml/vial.24FEB03	≥ 3,6 µg
Excipientes c.s.p.	2 ml
Adyuvantes: Fortasol y Microsol	
Preservantes: Timerosal y gentamicina	

Indicaciones de uso:

Como ayuda en la prevención de la viremia y de la excreción del Circovirus Porcino tipo 2.

Especies de destino:

Cerdos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Posología:

1 dosis de 2 ml. Revacunar a las 3 semanas.

Edad o peso:

A partir de las 3 semanas de edad.

Vía de administración:

Intramuscular

Modos de empleo:

- Antes de administrar, permita que alcance la temperatura ambiente
- Agitar antes de usar
- Administrar en forma aséptica

Contraindicaciones:

No vacunar durante gestación ni lactancia.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Usar sólo en animales sanos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

FICHA TÉCNICA

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Puede presentarse reacciones leves en el sitio de inyección. Si se presentan reacciones anafilácticas, tratar con epinefrina.

Período de resguardo:

Cero días.

Precauciones especiales para el operador:

Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección accidental pueden resultar en dolor severo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación o un dedo, y en casos raros, puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato.

Si usted es inyectado accidentalmente con este producto, busque atención médica de inmediato aunque sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve el inserto interno con usted. Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque atención médica otra vez.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un sitio oscuro a una temperatura de entre 2° y 8°C. No congelar.

Presentación:

Frasco conteniendo 100 mL equivalente a 50 dosis; 200 mL equivalente a 100 dosis ó de 500 mL equivalente a 250 dosis. Incluye prospecto interno.

Fabricado por:

Intervet Inc.
35500 West 91st Street, DeSoto, Kansas,
USA.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N°: 2006-B