

## FICHA TÉCNICA

### CIRCUMVENT® PCV M

Vacuna subunitaria Circovirus Porcino Tipo 2 e inactivada *Mycoplasma hypneumoniae*  
Emulsión inyectable

#### Composición:

Cada dosis (2 ml) contiene:

Antígeno subunitario ORF2, Circovirus Porcino Tipo 2, Cepa MSV-BAC/PCV2-ORF2; 98-99 1.2 ml/vial.24FEB03	≥ 3,6 µg
<i>Mycoplasma hypneumoniae</i> , Cepa 11	≥ 2,52 x 10 <sup>3</sup> recuento pre-inactivación
Excipientes c.s.p.	2 ml

Adyuvantes: Fortasol y Microsol  
Preservantes: Timerosal y Gentamicina

#### Indicaciones de uso:

Como una ayuda para reducir la carga viral y la eliminación del Circovirus Porcino Tipo 2 asociado a enfermedades relacionadas con Circovirus Porcino Tipo 2 (PCVD) y para reducir las lesiones pulmonares asociadas a la infección por *Mycoplasma hypneumoniae*.

#### Especies de destino:

Cerdos.

#### Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

##### Posología:

1 dosis de 2 ml. Revacunar a las 3 semanas.

##### Edad o peso:

A partir de las 3 semanas de edad.

##### Vía de administración:

Intramuscular

##### Modo de empleo:

- Antes de administrar, permita que alcance la temperatura ambiente
- Agitar antes de usar
- Administrar en forma aséptica

#### Contraindicaciones:

No vacunar durante gestación ni lactancia.

#### Advertencias y precauciones especiales de uso:

Vacunar solo cerdos sanos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## FICHA TÉCNICA

---

**Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

**Efectos no deseados o reacciones adversas:**

Se puede observar una reacción transitoria local en el sitio de inyección, que disminuye dentro de unas semanas. Puede ocurrir una reacción tipo hipersensibilidad; los animales se recuperarán dentro de unos minutos sin tratamiento adicional.

**Período de resguardo:**

Cero días.

**Precauciones especiales para el operador:**

Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección accidental pueden resultar en dolor severo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación o un dedo, y en casos raros, puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato.

Si usted es inyectado accidentalmente con este producto, busque atención médica de inmediato aunque sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve el inserto interno con usted.

Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque atención médica otra vez.

**Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar de 2° a 8° C. No congelar, proteger de la luz.

**Presentación:**

Frasco conteniendo 50, 100, 200 ó 500 ml.

**Fabricado por:**

Intervet Inc.

35500 West 91st Street, DeSoto, Kansas,  
USA.

**Importado y distribuido por:**

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

**USO VETERINARIO**

**VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA**

Reg. SAG N°: 2244-BP