

FICHA TÉCNICA

ABAMEC® L.A 1% Solución inyectable

Composición:

Cada 100 ml contiene:

Abamectina	1,0 g
Excipientes c.s.p.	100,0 ml

Indicaciones de uso:

Indicado para el control y tratamiento de las diferentes especies de parásitos gastrointestinales y pulmonares, así como también parásitos externos como ácaros de la sarna y piojos en bovinos.

Parásitos Gastrointestinales: (adultos e inmaduros)	<i>Ostertagia ostertagi</i> (incluso larvas inhibidas)
	<i>Ostertagia circumcincta</i>
	<i>Ostertagia trifurcata</i>
	<i>Haemonchus spp.</i>
	<i>Haemonchus contortus</i>
	<i>Trichostrongylus axei</i>
	<i>Trichostrongylus colubriformis</i>
	<i>Trichostrongylus vitrinus</i>
	<i>Cooperia spp.</i>
	<i>Cooperia oncophora</i>
	<i>Cooperia pectinata</i>
	<i>Cooperia curticei</i>
	<i>Bunostomum phlebotomum</i>
	<i>Oesophagostomum radiatum</i>
	<i>Oesophagostomum venulosum</i>
	<i>Nematodirus helvetianus</i> (adultos)
	<i>Nematodirus spathiger</i> (adultos)
<i>Nematodirus fillicolis</i> (adultos)	
<i>Strongyloides papillosus</i>	
<i>Strongyloides ransomi</i> (adultos)	
<i>Trichuris spp.</i>	
Ácaros:	<i>Psoroptes bovis</i>
	<i>Sarcoptes scabiei var. bovis</i>
Parásitos pulmonares (adultos e inmaduros)	<i>Dictyocaulus viviparus</i>
Piojos chupadores:	<i>Linognathus vituli</i>
	<i>Haematopinus eurysternus</i>

FICHA TÉCNICA

Especies de destino:

Bovinos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

El producto debe ser inyectado por vía subcutánea para lograr un efecto de larga acción.

El punto de administración sugerido es detrás de la paleta. Como toda administración inyectable, se deberá utilizar material estéril y seguir los procedimientos de asepsia. La dosis para bovinos es de 1 ml cada 50 Kg de peso vivo (equivalente a 200 mcg de abamectina/Kg de pesos vivo) en dosis única.

Contraindicaciones:

En la dosificación preescrita, el producto no tiene contraindicaciones. En las pruebas realizadas a nivel de campo, no se observó ningún efecto adverso en vacas preñadas o no.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

No usar en vacas lecheras.

- No usar el producto vía endovenosa.
- No tratar bovinos menores de 16 semanas de edad.
- No administrar en animales en estado febril, estresados o severamente debilitados.
- No administrar en vacas lactantes cuya leche sea destinada a consumo humano.
- No administrar en animales que serán beneficiados dentro de los próximos 55 días.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

Abamec puede ser administrado simultáneamente con vacunaciones, desparasitaciones contra Distomatosis, tonificaciones, castraciones y descornaduras.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

En una proporción muy baja, estadísticamente poco significativa, puede observarse una ligera tumefacción en el punto de inoculación. Entretanto, desaparece en pocos días, sin necesidad de medicación.

Período de resguardo:

55 días en bovinos.

Precauciones especiales para el operador:

No aplica.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar el producto en un lugar fresco y al abrigo de la luz. Conservar entre 15° C y 30° C.

Presentación:

Frascos de polipropileno PET con tapón de caucho y casquete de aluminio. Estuche de cartón conteniendo 1 frasco con 10, 20, 50, 100, 200 y 500 ml.

FICHA TÉCNICA

Fabricado por:

Ouro fino Saúde Animal Ltda.
Rodovia Anhanguera SP 330 s/n°, Km 298, Distrito industrial, Cravinhos,
Estado de Sao Paulo,
Brasil

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA
Reg SAG N° 448-B