

FICHA TÉCNICA

DUPLOCILLINE®

Penicilina G procaínica 150.000 U.I. - Penicilina G benzatínica 150.000 U.I.
Suspensión inyectable

Composición:

Cada mL de producto contiene:

Penicilina G procaínica	150.000 U.I.
Penicilina G benzatínica	150.000 U.I.
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones de uso:

Para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la penicilina en caballos, bovinos, ovinos, cerdos, perros y gatos, donde se requiere una terapia prolongada con una sola inyección.

Especies de destino:

Bovinos, caballos, ovinos, cerdos, perros y gatos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Vía de administración:

Administrar por inyección intramuscular profunda.

Dosis:

Bovinos y caballos	: 1 ml/25 kg de peso corporal. (6 mg/Kg ó 6000 UI/Kg de penicilina G procaína y 5 mg/Kg ó 6000 UI/Kg de penicilina G benzatína) Por inyección intramuscular.
Cerdos y ovinos	: 1 ml/20 kg de peso corporal. (7,5 mg/Kg ó 7500 UI/kg de penicilina G procaína y 6,5 mg/Kg ó 7500 UI/kg para penicilina G benzatína) Por inyección intramuscular.
Perros y gatos	: 1 ml/10 kg de peso corporal. (15 mg/Kg ó 15000 UI/kg de penicilina G procaína y 12,5 mg/Kg ó 15000 UI/kg para penicilina G benzatína) Por inyección subcutánea.

Intervalo de dosificación:

El tratamiento debe repetirse a las 72 horas.

Inyecciones repetitivas no deben ser colocadas en el mismo sitio anterior.

Contraindicaciones:

No administrar a animales alérgicos a la penicilina.

Individuos alérgicos a la penicilina, deben evitar el contacto del producto con la piel.

No usar cuando se encuentran microorganismos productores de β -lactamasas (penicilinas)

FICHA TÉCNICA

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Agitar el producto antes de usar.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

Puede ocurrir antagonismo entre Duplocilline® y preparaciones bacteriostáticas. Bacterias resistentes pueden surgir y mostrar una resistencia cruzada a otros antibióticos β -lactámicos. Se ha observado sinergismo con otras preparaciones bactericidas.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Ocasionalmente se han observado reacciones alérgicas.

Período de resguardo:

Carne: 30 días.
Leche: No usar en animales cuya leche sea destinada al consumo humano.
No utilizar en equinos destinados al consumo humano.

Precauciones especiales para el operador:

Individuos alérgicos a la penicilina deben evitar el contacto del producto con la piel.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar entre 2° y 8° C. No congelar.

Presentación:

Estuche conteniendo frasco con 30, 50, 100 ó 250 mL de producto. Incluye inserto.

Fabricado por:

Intervet Productions S.r.l.,
Via Nettunense KM 20.300,
04011 Aprilia,
Italia.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA
Reg. SAG N°: 1344-B