

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® AE+POX

Vacuna viva Encefalomiелitis Aviar y Difteroviruela Aviar Polvo liofilizado

Composición:

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Encefalomiелitis aviar, Cepa Calnek 1143	≥10 ^{1,8} EID ₅₀
Virus Pox aviar, Cepa Gibbs	≥10 ^{1,8} EID ₅₀
Excipientes c.s.p.	1 dosis

Indicaciones de uso:

Como ayuda en la prevención de la Difteroviruela Aviar en las aves vacunadas y de la Encefalomiелitis Aviar en la progenie de las aves vacunadas.

Especies de destino:

Pollos y pavos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis:

0,01 mL de vacuna.

Vía de administración:

Punción en el pliegue del ala, utilizando el aplicador suministrado.

Programas de vacunación:

Dosis única.

Los pollos deben ser vacunados entre 8 y 16 semanas de edad.

Los pavos deben ser vacunados entre 18 y 26 semanas de edad.

Modo de empleo:

Preparación de la vacuna:

- Un frasco de vacuna conteniendo 500 ó 1000 dosis debe ser reconstituido con 5 ó 13 mL de diluyente, respectivamente, utilizando el conector proporcionado, inmediatamente antes del uso.
- El aplicador debe ser sumergido dentro de la vacuna y luego aplicado por punción en el pliegue del ala desde abajo. Se deben evitar las zonas del ala con plumas.
- Alrededor de 7-10 días después de la vacunación, se deben examinar algunas aves para verificar la "respuesta" a la vacunación.
- Una respuesta satisfactoria incluye inflamación de la piel y formación de una costra en el sitio de inoculación.
- Las costras normalmente se caen 2-3 semanas después de la vacunación.

Vacunación combinada con Nobilis® CAV P4, Reg. SAG N°007-B:

- Reconstituir la vacuna Nobilis® AE+POX usando el diluyente Dilavia, 10 mL por 1000 dosis. Luego inyectar asépticamente este contenido en un frasco de Nobilis® CAV P4 de 1000 dosis. La vacuna está lista para ser usada.
- El aplicador debe ser sumergido dentro de la vacuna y luego aplicado por punción en el pliegue del ala desde abajo. Se deben evitar las zonas del ala con plumas.

FICHA TÉCNICA

Contraindicaciones:

No usar durante la postura.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

No vacunar durante los 28 días previos al comienzo de la postura.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos, salvo con Nobilis® CAV P4, Reg SAG N°007-B.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

No se han descrito.

Período de resguardo:

Cero días.

Precauciones especiales para el operador:

Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección accidental pueden resultar en dolor severo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación a un dedo, y en casos raros, puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato.
Si usted es inyectado accidentalmente con este producto, busque atención médica de inmediato aunque sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve el inserto interno con usted.
Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque atención médica otra vez.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar. Proteger de la luz.
Utilizar inmediatamente una vez reconstituida.

Presentación:

Frasco de 500 o 1000 dosis y frasco de 5 o 13 mL de diluyente. Incluye prospecto interno, conector y aplicador.

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Koverstraat 35,
5831 AN Boxmeer, Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N°1148-B