

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® IB + ND + EDS

Vacuna inactivada Bronquitis infecciosa, Enfermedad de Newcastle
y Síndrome de Caída de Postura
Emulsión inyectable

Composición:

Cada dosis de 0,5 ml contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa, cepa Massachusetts	≥ 6 log ₂ unidades HI
Virus Newcastle, cepa Clone 30	≥ 50 PD ₅₀
Adenovirus aviar (EDS 76), cepa BC14	≥ 6,5 log ₂ unidades HI
Excipientes c.s.p.	0,5 ml
Inactivante: Formaldehído	
Adyuvante: Parafina líquida	

Indicaciones de uso:

Como ayuda en la prevención de Bronquitis Infecciosa Massachusetts, Enfermedad de Newcastle y Síndrome de Caída de Postura en ponedoras y reproductoras.

Especies de destino:

Pollos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Programa de vacunación recomendado

Nobilis® IB+ND+EDS debe ser aplicada a las aves a las 16-20 semanas de edad pero no menos de 4 semanas antes de la fecha probable del comienzo de la postura.

Para un efecto booster óptimo, las aves deben ser primovacunadas con vacunas vivas contra la Bronquitis Infecciosa y la Enfermedad de Newcastle.

Los mejores resultados serán obtenidos si la vacunación con vacunas inactivadas se realiza 6 o más semanas después de la administración de la primovacunación viva.

Dosis y administración

Cada ave debe recibir 0,5 ml de vacuna vía intramuscular en los músculos de la pierna o por vía subcutánea en la parte inferior del cuello.

Contraindicaciones:

No vacunar durante la postura.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Antes de usar la vacuna, permita que ésta alcance la temperatura ambiente (15°-30°C). Agite bien antes de usar.

Use agujas y jeringas estériles.

Mantener fuera del alcance de los niños.

FICHA TÉCNICA

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Puede observarse una ligera inflamación en el lugar de la inyección o una reacción tisular local durante las semanas siguientes a la vacunación.

Período de resguardo:

Cero días.

Precauciones especiales para el operador:

Puede ocurrir una reacción local cuando se inyecta accidentalmente a la persona que administra el producto. Se recomienda consultar a un médico inmediatamente, mencionando que se trata de una emulsión agua-aceite.

Condiciones de almacenamiento:

La vacuna debe ser almacenada a una temperatura de 2° a 8°C. No congelar.
Los frascos abiertos deben ser usados dentro de 3 horas.

Presentación:

Frasco de 500 mL (1000 dosis).

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Koverstraat 35,
5831 AN Boxmeer, Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg SAG N°1149-B