

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® ND C2

Vacuna a virus vivo modificado contra la Enfermedad de Newcastle en pollos
Polvo liofilizado

Composición:

Cada dosis contiene:

Virus Newcastle, Cepa C2 $\geq 10^{5,7}$ EID₅₀

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Preservante: Gentamicina

Indicaciones de uso:

Inmunización activa de pollos para reducir los signos clínicos y mortalidad causada por el virus de la enfermedad de Newcastle.

Especies de destino:

Pollos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis:

1 dosis/pollo

Frecuencia:

Dosis única. Se recomienda revacunar 2-3 semanas después con una vacuna viva lentogénica para aumentar la inmunidad.

Edad o peso:

A partir del 1er día de edad

Condición fisiológica:

Pollos sanos

Vía de administración:

Instilación óculo/nasal o spray.

Modo de empleo:

La vacuna puede ser entregada como liofilizado en frasco de vidrio o como esferas liofilizadas en capsulas. En caso de que el producto este presentado en capsulas, no usar el producto si este está cafesoso o pegado al envase, ya que indica que la integridad del envase ha sido violada. Cada envase debe ser administrado inmediatamente y de forma completa una vez abierto.

- Aplicación óculo-nasal: Reconstituir la vacuna con la cantidad apropiada de un diluyente apropiado y administrar por medio de un gotero estandarizado. Una gota debería ser aplicada dentro del orificio nasal o un ojo. Asegurarse que la gota nasal sea inhalada antes de liberar el ave. Para la administración óculo/nasal un diluyente especial, Nobilis Diluent Oculo Nasal, está disponible en un gotario en dos formas de dosificación (1.000 y 2.500 dosis).

FICHA TÉCNICA

- **Aplicación spray:** Reconstituir la vacuna en agua fría y limpia a la cual puede ser agregada 2% de leche descremada. El número apropiado de frascos que debe ser abierto bajo el agua o el contenido de la(s) cápsula(s) debe ser vertido en el agua. En ambos casos, mezclar bien el agua conteniendo la vacuna antes de usar. Después de la reconstitución la suspensión debe verse transparente. El volumen de diluyente para reconstituir debe ser suficiente para asegurar una distribución uniforme cuando se rocía sobre las aves. Esto variara de acuerdo a la edad de las aves que son vacunadas y al sistema de manejo, pero se sugiere 200 a 500 ml de agua para 1000 dosis. La suspensión vaccinal debe ser rociada distribuida uniformemente a las aves a una distancia de 30-40 cm, preferiblemente cuando las aves están sentadas juntas en el corral de luz. El aparato de spray debe estar libre de sedimentos, corrosión y trazas de desinfectantes e idealmente debe ser ocupado solo para propósitos de vacunación.

Contraindicaciones:

No vacuna durante la postura.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Vacunar solo pollos sanos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos o reacciones adversas:

No se han descrito.

Período de resguardo:

Cero días.

Precauciones especiales para el operador:

El operador debe utilizar mascarilla y lentes protectores al administrar la vacuna, ya que el virus Newcastle puede producir inflamación en los párpados del ser humano. Debe consultar al médico ante cualquier sintomatología ocular.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar.

El diluyente se almacena a temperatura ambiente (entre 15-30°C).

Utilizar inmediatamente una vez reconstituida.

Presentación:

Caja con 1 o 10 frascos de 500, 1000, 2500, 3000, 5000 o 10000 dosis.

Caja con 10 capsulas de 1.000, 2.500, 5.000 o 10.000 dosis.

Frasco de diluyente óculo nasal para la presentación de 1000 y 2500 dosis.

FICHA TÉCNICA

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Koverstraat 35,
5831 AN Boxmeer, Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg SAG N°2008-B