

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® REO+IB+G+ND

Vacuna inactivada contra Reovirus Aviar, Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de Gumboro y Newcastle
Emulsión inyectable

Composición:

Cada dosis de 0,5 ml contiene:

Reovirus Aviar, cepa 1733	≥ 7,4 log ₂ unidades ELISA
Reovirus Aviar, cepa 2408	≥ 7,4 log ₂ unidades ELISA
Virus Bronquitis Infecciosa, cepa M41, tipo Mass	≥ 6,0 log ₂ unidades HI Virus
Gumboro, cepa D78	≥ 14,5 log ₂ unidades VN Virus
Newcastle, cepa Clone 30	≥ 50 PD ₅₀
Excipientes c.s.p.	0,5 ml

Indicaciones de uso:

Como ayuda en la prevención de Reovirus, Bronquitis Infecciosa (producida por el virus tipo Massachusetts), Enfermedad de Gumboro y Enfermedad de Newcastle, en reproductoras y en la progenie de las aves vacunadas contra la Enfermedad de Gumboro y Reovirus.

Especies de destino:

Gallinas reproductoras.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis:

0,5 ml por vía intramuscular en el muslo o en el pecho o vía subcutánea en la parte posterior del cuello.

Programa de vacunación recomendado:

Nobilis® REO+IB+G+ND debe usarse en aves de edades comprendidas entre las 16 y las 20 semanas pero nunca durante las 4 semanas previas a la fecha prevista para el comienzo de la postura.

Para un efecto óptimo de la dosis de refuerzo, las aves deben ser vacunadas previamente con la vacuna viva contra la Bronquitis Infecciosa, la Enfermedad de Newcastle, Reovirus Aviar y la Enfermedad de Gumboro.

Los mejores resultados se obtienen cuando la vacunación con la vacuna inactivada se realiza al menos 6 semanas después de la administración de la vacuna viva, pero en ningún caso debe administrarse durante las 4 semanas siguientes a la primovacuna con el serotipo variante.

Contraindicaciones:

No usar durante la postura.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Vacunar sólo aves sanas.

FICHA TÉCNICA

Antes de usar, permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15°-25°C). Agitar bien antes de usar. Utilizar un equipo de inyección estéril. Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Puede observarse una ligera inflamación en el lugar de la inyección o una reacción tisular durante las semanas siguientes a la vacunación.

Período de resguardo:

Cero días.

Precauciones especiales para el operador:

Puede ocurrir una reacción local cuando se inyecta accidentalmente a la persona que administra el producto. Se recomienda consultar a un médico inmediatamente, mencionando que se trata de una emulsión agua-aceite.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar entre 2°-8°C en la oscuridad. No congelar. Utilizar inmediatamente una vez abierta.

Presentación:

Frasco de 250 mL (500 dosis) o 500 ml (1000 dosis).

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Koverstraat 35,
5831 AN Boxmeer, Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg SAG N°1144-B