

## FICHA TÉCNICA

---

**NOBILIS® SALENVAC**  
Vacuna Inactivada *Salmonella Enteritidis*  
Suspensión inyectable

**Composición:**

Cada dosis contiene:

*Salmonella enteritidis*, fago tipo 4, cepa 109  $\geq 2 \times 10^9$  (células inactivadas con formalina)

Excipientes c.s.p. 1 mL

- Adyuvante: Hidróxido de aluminio gel
- Inactivante: Formaldehido

**Indicaciones de uso:**

Inmunización activa, como ayuda en el control de la infección por *Salmonella enteritidis*, fagotipo 4.

Inmunización pasiva, como ayuda en el control de la infección por *Salmonella enteritidis*, fagotipo 4, en la progenie de las reproductoras vacunadas.

**Especies de destino:**

Pollas de reemplazo, reproductoras y ponedoras.

**Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:**

Dosis:

0,1 ó 0,5 mL/ave

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:

Aplicar 2 dosis más un refuerzo de acuerdo al siguiente programa de dosis:

- 1era dosis: 0,1 mL al primer día de edad.
- 2da dosis: 0,5 mL a las 4 semanas de edad.
- Refuerzo: 0,5 mL a las 18 semanas de edad.

Edad o peso:

A partir del primer día de edad.

Condición fisiológica:

Aves sanas.

Vía(s) de administración:

Intramuscular (en el muslo de la pierna).

Modo de empleo:

Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de aplicar.

Agitar antes y durante la administración.

Administrar en forma aséptica.

## FICHA TÉCNICA

---

**Contraindicaciones:**

Ninguna conocida.

**Advertencias y precauciones especiales de uso:**

Mantener fuera del alcance de los niños.

**Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

**Efectos no deseados o reacciones adversas:**

Ocasionalmente se puede presentar una reacción de hipersensibilidad, reacción local inflamatoria o un nódulo en el punto de inoculación, los cuales desaparecen espontáneamente, sin necesidad de tratamiento.

**Período de resguardo:**

Cero días.

**Precauciones especiales para el operador:**

En caso de autoinyección accidental, buscar atención médica ya que puede producirse una reacción local severa.

**Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar refrigerado entre 2° y 8°C. No congelar.

**Presentación:**

Botellas colapsables de polietileno de 250 y 500 mL.

**Fabricado por:**

Intervet International BV.  
Wim de Körverstraat, 5831 AN Boxmeer,  
Holanda.

**Importado y distribuido por:**

Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.

**Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.**

**USO VETERINARIO**

**VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA**

**Reg SAG N°564-B**