

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® TRT INAC
Vacuna inactivada contra Rinotraqueítis Aviar
Emulsión inyectable

Composición:

Cada dosis de 0,5 ml contiene:

Pneumovirus Aviar Inactivado

Cepa BUT1 N°8544 100 unidades antígeno ELISA induce $\geq 10 \log_2$ unidades ELISA

Excipientes c.s.p. 0,5 mL

Adyuvante: Parafina líquida

Inactivante: β -propiolactona

Indicaciones de uso:

Como ayuda para reducir la mortalidad y signos clínicos (incluida la caída en la producción de huevos) inducida por la infección del virus de la Rinotraqueítis Aviar.

Especies de destino:

Pollos (reproductoras y ponedoras) y pavos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Posología:

Dosis única de 0,5 ml

Vía de administración:

Intramuscular en el músculo del muslo o del pecho o subcutáneo en la parte baja del cuello.

Esquema de vacunación:

- Pollos: Vacunar entre 14-20 semanas de edad, pero no más tarde que 4 semanas previas al comienzo de la postura.
- Pavos: Vacunar a las 28 semanas de edad.

Modo de empleo:

- Antes de usar la vacuna permitir que esta alcance la temperatura ambiente (15-25°C).
- Agitar el envase vigorosamente antes y durante su uso.
- Usar equipo estéril de vacunación.
- No usar equipo de vacunación con partes de goma ya que el excipiente puede dañar ciertos tipos de caucho.

Contraindicaciones:

No usar durante la postura.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños.

FICHA TÉCNICA

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Una inflamación leve y transitoria se puede palpar en el sitio de inyección durante dos semanas.

Período de resguardo:

Cero días.

Precauciones especiales para el operador:

En caso de una auto-inyección accidental, acudir a un médico y mostrar la etiqueta del frasco.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado, entre 2°C y 8°C y protegido de la luz. No congelar.

Presentación:

Frascos de 250 ml (500 dosis) o 500 ml (1000 dosis).

Fabricado por:

Intervet International BV.
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxmeer, Holanda

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg SAG N°2170-B