

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® Intra-Trac Oral Bb
Vacuna viva contra Bordetella bronchiseptica
Polvo liofilizado para suspensión oral

Composición:

Cada dosis contiene:

Bordetella bronchiseptica, cepa B-C2 $\geq 1 \times 10^9$ CFU/dosis

Excipientes c.s.p. 1 mL

Diluyente: Agua para inyectables

Indicaciones de uso:

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina o Tos de las Perras.

Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

Especies de destino:

Perros.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis:

1 mL

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:

Se recomienda revacunación anual con 1 dosis.

Edad o peso:

A partir de las 7 semanas de edad.

Condición fisiológica:

Animales sanos y desparasitados.

Vía de administración:

Oral

Modo de empleo:

Reconstituir asépticamente la vacuna deshidratada con el diluyente proporcionado.

Agitar bien antes del uso.

Retirar la aguja y administrar en la cavidad bucal.

Utilizar agujas nuevas, no esterilizadas químicamente.

Contraindicaciones:

No se han descrito.

FICHA TÉCNICA

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto a la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

El uso de esta vacuna puede producir ocasionalmente anafilaxis y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad inmunomediadas.

Antídoto: Epinefrina, corticoesteroides y antihistamínicos, pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

Período de resguardo:

No aplica.

Precauciones especiales para el operador:

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado: Entre 2 y 8°C. No congelar.

Diluyente: Puede ser almacenado a temperatura ambiente (15-25°C).

Presentación:

Estuche conteniendo 25 frascos de vacuna y 25 frascos de diluyente.

Fabricado por:

Intervet Inc.

21401 West Center Road

Elkhorn, Nebraska 68022, USA

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N°2468-B