

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® LEPTO

Vacuna inactivada contra *Leptospira canicola* e *icterohaemorrhagiae*
Suspensión inyectable

Composición:

Cada dosis contiene:

L. <i>canicola</i> , cepa Ca-12-000	800-1900 Unidades ELISA
L. <i>icterohaemorrhagiae</i> , cepa 820 K	750-1500 Unidades ELISA
Excipientes c.s.p.	1 ml
Preservante: Timerosal	
Inactivante: B propiolactona	

Indicaciones de uso:

Para la inmunización activa de perros como ayuda en la prevención de Leptospirosis producida por los serogrupos *canicola* e *icterohaemorrhagiae*.

Especies de destino:

Perros.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Vacunación básica:

Administre 1 ml vía subcutánea por animal.

Todos los perros no vacunados previamente deben vacunarse dos veces con una separación de 2 – 4 semanas. Los cachorros pueden recibir la primera vacunación a partir de las 8 semanas de edad.

Se recomienda una revacunación anual.

Las vacunas deben ser administradas por inyección subcutánea, tomando las precauciones de asepsia correspondientes.

Las siguientes recomendaciones se incluyen ya que es probable que la inmunización con Nobivac® Lepto forme parte de un programa más completo de vacunación:

a. Programa para cachorros cuando la exposición al distemper y/o parvo es posible antes de las 8-9 semanas de edad; y el estatus de inmunidad materna (MDA) del cachorro es desconocido:

Edad 4-6 semanas	Nobivac® Puppy DP (Reg. SAG N°1153-B)
Edad 8-9 semanas	Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac Diluent o Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B)
Edad 12 semanas	Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B) o Nobivac® Rabia (Reg. SAG N°1496-B)

b. Programa para cachorros donde la vacunación comienza a la edad de 8-9 semanas:

Edad 8-9 semanas	Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac Diluent o Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B)
Edad 12 semanas	Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B) o Nobivac® Rabia (Reg. SAG N°1496-B)

FICHA TÉCNICA

c. Programa para cachorros donde la vacunación no comienza antes de la edad de 12 semanas:

Edad 12 semanas	Nobivac® DHPPI (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B) o Nobivac® Rabia (Reg. SAG N°1496-B)
Edad 14-15 semanas	Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B)

Contraindicaciones:
Ninguna.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Agitar bien antes de usar.

Deben vacunarse sólo perros sanos y se debe realizar un examen clínico adecuado antes de la inoculación.

Debe usarse equipo estéril para la administración.

Se debe tener cuidado con la exposición prolongada o repetitiva en ambientes con altas temperaturas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos, salvo con Nobivac® DHPPI (Reg. SAG N°020-B), Nobivac® Puppy DP (Reg. SAG N°1153-B) y Nobivac® Rabia (Reg. SAG N°1496-B).

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación. Estas reacciones son autolimitantes en la mayoría de los casos.

Período de resguardo:

No aplica.

Precauciones especiales para el operador:

Si la persona que administra la vacuna se inyectara accidentalmente, puede aparecer una reacción local. Se recomienda acudir al médico, mostrándole el inserto o etiqueta.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar refrigerado entre 2° y 8°C, en la oscuridad. No congelar.

Presentación:

Estuche conteniendo 10 frascos de 1 ml cada uno, equivalente a 1 dosis. Incluye inserto.

Fabricado por:

Intervet International BV.
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxmeer, Holanda

FICHA TÉCNICA

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg SAG N°1342-B