

**FICHA TÉCNICA****NOBIVAC® RABIA**Vacuna inactivada contra la Rabia  
Suspensión inyectable**Composición:**Cada dosis contiene:

Virus rábico, cepa Pasteur/RIV ≥2 UI

Excipientes c.s.p. 1 mL

Preservante: Timerosal

Adyuvante: Fosfato de aluminio

**Indicaciones de uso:**

Para la inmunización activa, como ayuda en la prevención de la rabia.

Establecimiento de la inmunidad:

4 semanas

Duración de la inmunidad:

- Perros y gatos: 3 años
- Bovinos y caballos: 2 años
- Zorros, ovinos, caprinos y hurones: 1 año

**Especies de destino:**

Perros, gatos, bovinos, ovinos, caprinos, zorros, hurones y caballos.

**Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:**Dosis y administración:

Administrar 1 mL de la vacuna por vía subcutánea o intramuscular (según la especie).

Programa de Vacunación recomendado:

	Perros/Gatos	Bovinos/Caballos	Zorros	Ovinos/Caprinos	Hurones
Vacunación primaria a una edad mayor que	3 meses	6 meses	3 meses	6 meses	3 meses
Revacunación cada	3 años	2 años	1 año	1 año	1 año
Vía de administración	IM o SC	IM	IM o SC	IM	SC

Modo de empleo:

Agitar antes de usar. Permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15-25°C) antes de usar. Administrar en forma aséptica.

**Contraindicaciones:**

No utilizar en animales que muestren signos de rabia o que se sospeche puedan estar infectados con el virus de la rabia.

**Advertencias y precauciones especiales de uso:**

Mantener fuera del alcance de los niños.

## FICHA TÉCNICA

---

### **Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

No utilizar en forma concomitante con otros productos, salvo con Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°20-B) y Novibac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B) en perros y Nobivac® Tricat Trio (Reg SAG N°1916-B) en gatos.

### **Efectos no deseados o reacciones adversas:**

Ocasionalmente pueden producirse reacciones locales en el sitio de inyección, tales como la presencia de un nódulo palpable transitorio, eritema, edema, dermatitis y dolor. Raramente se pueden presentar reacciones generalizadas de hipersensibilidad a nivel sistémico (edema, letargia, prurito, hipertermia), digestivo (vómito, hipersalivación, diarrea), respiratorio (disnea) tras la vacunación. En estos casos se debe administrar un tratamiento sintomático.

### **Uso durante preñez y lactancia**

Solo en perras se puede utilizar durante las etapas de gestación y lactancia.

### **Período de resguardo:**

Perros, gatos, zorros, hurones: No aplica.

Bovinos, ovinos, caprinos, caballos: Cero días.

### **Precauciones especiales para el operador:**

En caso de autoinyección accidental, solicitar atención médica.

### **Condiciones de almacenamiento:**

Mantener refrigerado: Entre 2° y 8°C. No congelar.

Una vez abierto el frasco multidosis, utilizar el contenido completo antes de 3 horas y descartar el producto sobrante.

### **Presentación:**

Estuche de cartulina conteniendo 1, 10 o 50 frascos de 1 dosis cada uno. Incluye inserto.

Estuche de cartulina conteniendo 1, 5, 10, 15, 20, 25 o 50 frascos de 10 dosis cada uno. Incluye inserto.

Estuche PET conteniendo 10 o 50 frascos de 1 dosis. Incluye inserto.

### **Fabricado por:**

Intervet International BV.

Wim de Körverstraat 35,

5831 AN Boxtmeer, Holanda

### **Importado y distribuido por:**

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.

**Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.**

### **USO VETERINARIO**

**VENTA SOLO A MÉDICOS VETERINARIOS**

**Reg SAG N°1496-B**