

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® CAV P4

Vacuna viva modificada Anemia Aviar
Polvo liofilizado

Composición:

Cada dosis de vacuna reconstituida contiene:

Virus CAA atenuado, cepa 26P4 $\geq 10^{3,0}$ TCID₅₀
Excipientes c.s.p. 1 dosis

Indicaciones de uso:

Vacunación de pollos como ayuda en la prevención de Anemia Infecciosa Aviar desde las 6 semanas de edad en adelante y hasta 6 semanas previo al inicio de postura.

Especies de destino:

Pollos (reproductoras broiler)

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis:

0,2 a 0,5 mL según modo de empleo.

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:

Dosis única.

Edad o peso:

Pollos: a partir de las 6 semanas de edad.

Reproductores: 6 semanas antes del inicio de la postura.

Condición fisiológica:

Animales sanos.

Vía(s) de administración:

Intramuscular o subcutánea.

Modo de empleo:

1. Para uso con la vacuna inactivada Nobilis® REO+IB+G+ND (Reg. SAG N°1144-B):
 - Reconstituir 1000 dosis de la vacuna Nobilis® CAV P4 en 2 mL de suero fisiológico estéril e inyectar asépticamente este contenido a la vacuna viral inactivada (1000 dosis). Agitar bien la vacuna antes de usar.
 - Administrar 0,5 mL de la vacuna mezclada mediante inyección intramuscular o subcutánea.
2. Para uso con la vacuna viva Nobilis® AE+POX (Reg. SAG N°1148-B):
 - Ver instrucciones para el uso combinado en la vacuna Nobilis® AE+POX.

Contraindicaciones:

La vacuna no debe ser usada durante la postura.

FICHA TÉCNICA

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

Puede ser combinada con la vacuna inactivada Nobilis® REO+IB+G+ND (Reg. SAG N°1144-B) vía intramuscular o subcutánea o con la vacuna Nobilis® AE+POX (Reg. SAG N°1148-B) por punción de la membrana del ala.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos distintos a los mencionados anteriormente. Por lo cual se recomienda no administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la vacunación.

Efectos o reacciones adversas:

No se han descrito.

Uso durante postura y en animales reproductores:

No utilizar durante la postura.

Período de resguardo:

Cero días.

Precauciones especiales para el operador:

Lavar y desinfectar las manos y el equipo después de cada vacunación.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado (2-8°C). No congelar.

Presentación:

Estuche conteniendo 10 frascos de 1000 dosis cada uno. Incluye inserto.

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer
Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg SAG N°007-B