



NOBIVAC® LEPTO
Suspensión inyectable

FICHA TÉCNICA

Las siguientes recomendaciones se incluyen ya que es probable que la inmunización con Nobivac® Lepto forme parte de un programa más completo de vacunación:

a. Programa para cachorros cuando la exposición al distemper y/o parvo es posible antes de las 8-9 semanas de edad; y el estatus de inmunidad materna (MDA) del cachorro es desconocido:

Edad 4-6 semanas	Nobivac® Puppy DP (Reg. SAG N°1153-B)
Edad 8-9 semanas	Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac Diluent o Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B)
Edad 12 semanas	Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B) o Nobivac® Rabia (Reg. SAG N°1496-B)

b. Programa para cachorros donde la vacunación comienza a la edad de 8-9 semanas:

Edad 8-9 semanas	Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac Diluent o Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B)
Edad 12 semanas	Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B) o Nobivac® Rabia (Reg. SAG N°1496-B)

c. Programa para cachorros donde la vacunación no comienza antes de la edad de 12 semanas:

Edad 12 semanas	Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B) o Nobivac® Rabia (Reg. SAG N°1496-B)
Edad 14-15 semanas	Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B)

Contraindicaciones:

Ninguna.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Se debe tener cuidado con la exposición prolongada o repetitiva en ambientes con altas temperaturas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos, salvo con Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B), Nobivac® Puppy DP (Reg. SAG N°1153-B) y Nobivac® Rabia (Reg. SAG N°1496-B).

Efectos o reacciones adversas:

Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación. Estas reacciones son autolimitantes en la mayoría de los casos.

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:

La vacuna ha demostrado ser segura en hembras preñadas.

Período de resguardo:

No aplica.



NOBIVAC® LEPTO
Suspensión inyectable

FICHA TÉCNICA

Precauciones especiales para el operador:

En caso de autoinyección accidental, puede aparecer una reacción local. Se recomienda acudir al médico, mostrándole el inserto o etiqueta.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar refrigerado entre 2° y 8°C. No congelar.

Presentación:

Estuche conteniendo 10 frascos de 1 ml cada uno, equivalente a 1 dosis. Incluye inserto.

Fabricado por:

Intervet International BV.
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxmeer, Holanda

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg SAG N°1342-B