

FICHA TÉCNICA

T61®

Embutramida 200 mg – Yoduro de Mebezonio 50 mg
 Clorhidrato de Tetracaína 5 mg
 Solución Inyectable

Composición:

Cada mL de solución contiene:

Embutramida	200 mg
Yoduro de mebezonio	50 mg
Clorhidrato de tetracaína	5 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones de uso:

Solución para eutanasia de animales.

Especies de destino:

Perros, gatos, otros animales pequeños tales como: aves ornamentales, palomas, visones, hámsters, cobayos y animales de laboratorio; y en animales grandes no destinados a consumo humano.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Se administra por vía intravenosa, intracardiaca o intrapulmonar.

Solo utilizar en animales inconscientes

Perros:

<i>Inyección intravenosa lenta</i>	: 0,3 – 0,5 mL/kg de peso corporal
<i>Inyección intrapulmonar</i>	: Hasta 10 kg de peso corporal: 7 – 10 mL/animal Más de 10 kg de peso: 13 – 20 mL/animal dependiendo del peso corporal.
<i>Inyección intracardiaca</i>	: 0,3 mL/kg de peso corporal

Gatos:

Inyección intrapulmonar:

Gatos de pocos días de vida	: 1 mL/animal
Gatos de hasta 6 meses de edad	: 3 mL/animal
Gatos de más de 6 meses de edad	: 5 mL/animal
Gatos de más de 5 kg de peso	: 10 mL/animal

Otros animales pequeños tales como aves ornamentales, palomas, visones, hámsters, cobayos y pequeños animales de laboratorio:

Inyección intrapulmonar: 0,5 – 2,0 mL/animal, dependiendo del peso corporal.

Animales grandes no destinados a consumo humano:

Inyección intravenosa lenta: 4,0 – 6,0 mL/50 kg de peso corporal.

FICHA TÉCNICA

Contraindicaciones:

No utilizar en animales conscientes.

No utilizar en hembras preñadas.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Solo utilizar por veterinarios.

Solamente usar en animales inconscientes (narcotizados), para evitar una posible sofocación en animales conscientes bajo condiciones desfavorables de uso o absorción.

Se necesita atención especial durante el uso de este producto.

Al utilizar la vía endovenosa, se debe asegurar la administración completa de la dosis, por lo tanto se aconseja el uso de un catéter endovenoso.

En animales con deficiencias circulatorias o cardíacas, puede retrasarse el efecto, debido a un transporte más lento del producto al sitio de acción.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

Ninguna conocida.

Efectos y reacciones adversas:

En casos aislados se han reportado convulsiones o excitación. Paros cardíacos pueden retrasarse.

Nota: el uso del producto provoca lesiones histopatológicas tales como lesiones endoteliales, congestión pulmonar, edema pulmonar y hemólisis.

Período de resguardo:

No administrar en animales cuya carne se destine al consumo humano o animal.

Precauciones especiales para el operador:

Evitar el contacto directo con el producto.

Retirar inmediatamente la ropa contaminada.

En caso de contacto directo con heridas o mucosas, lavar inmediatamente el área con abundante agua y jabón.

En caso de inyección accidental, lavar inmediatamente la herida con abundante agua y jabón y presionar alrededor del punto de inyección con el fin de eliminar el producto.

En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia por varios minutos.

En caso de ingestión accidental por auto inyección, buscar atención médica inmediata y mostrar el empaque o el inserto del producto al médico.

FICHA TÉCNICA

Los antidotos son analépticos (contra la acción narcótica) y fisostigmina (contra la acción curarizante).

El producto es tóxico y puede provocar la muerte.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a una temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Presentación:

Estuche con frasco de 50 mL.

Fabricado por:

Intervet International GMBH.

Feldstraße 1ª, 85716 Unterschleissheim,
Alemania.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA RETENIDA

Reg SAG N°1010