

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® SALENVAC T

Vacuna inactivada *Salmonella Enteritidis* y *Salmonella typhimurium*
 Suspensión inyectable

Composición:

Cada dosis de 0,5 mL contiene:

Salmonella enteritidis, Cepa 109, Fagotipo 4 ≥ 1 RP

Salmonella typhimurium, Cepa DT104 ≥ 1 RP

Excipientes c.s.p. 0,5 mL

Inactivante: Formaldehído

Adyuvante: Hidróxido de aluminio

Preservante: Tiomersal

Indicaciones de uso:

Para la inmunización activa de gallinas y para la inmunización pasiva de la progenie para reducir la colonización del ciego y la excreción fecal de *S. enteritidis* y *S. typhimurium*.

Inmunización activa:

- Establecimiento de la inmunidad: 4 semanas posteriores a la segunda administración
- Duración de la inmunidad: hasta las 57 – 60 semanas de edad.

Inmunización pasiva:

- Establecimiento de la inmunidad: 1 día después del nacimiento.
- Duración de la inmunidad: hasta 14 días después del nacimiento.
- La inmunidad pasiva se transfiere desde 4 semanas después de la segunda vacunación hasta las 59 semanas de edad del ave progenitora.

Especies de destino:

Pollas de reemplazo, reproductoras y ponedoras comerciales.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Posología:

- 1° dosis: a partir de las 6 semanas de edad.
- 2° dosis: a lo menos 4 semanas después de la primera dosis pero no después de las 16 semanas de edad.

Adicionalmente y de acuerdo al riesgo de infección en la etapa de crianza, se puede vacunar pollitos de 1 día de edad, con dosis reducida de 0,1 mL vía IM y repetir a las 4 semanas de edad con una dosis de 0,5 mL.

Contraindicaciones:

No usar durante la postura.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Agitar la vacuna antes de usar.

No se han desarrollado estudios para evaluar el efecto de los anticuerpos maternos en respuesta a la vacunación. Por lo tanto, en caso de vacunación de pollitos de 1 día de edad, solamente deben ser vacunados pollitos de lotes de madres no vacunadas y no infectadas.

FICHA TÉCNICA

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos o reacciones adversas:

La aplicación de la vacuna puede producir inflamación pasajera en el sitio de inyección, letargia, cojeras y disminución de la ganancia diaria de peso, en forma transitoria y pasajera por un período de aproximadamente 2 días.

Las reacciones adversas son más marcadas en pollitos de 1 día de edad.

Excepcionalmente la inflamación puede permanecer hasta por 15 días post vacunación.

Uso durante postura y en animales reproductores:

No usar durante la postura.

Período de resguardo:

Cero días.

Precauciones especiales para el operador:

En caso de una auto-inyección accidental, ir inmediatamente por asistencia médica y mostrar el prospecto inserto o la etiqueta al médico.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado, entre 2° C y 8° C. No congelar.

Usar el contenido completo una vez abierto el envase.

Presentación:

Frascos de 250 o 500 mL. Incluye prospecto interno.

Fabricado por:

MSD Animal Health UK Limited
Walton Manor, Walton
Milton Keynes, Buckinghamshire,
Reino Unido

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg SAG N°2177-B