

FICHA TÉCNICA

PORCILIS® Ery + Parvo + Lepto

Vacuna inactivada Erisipela, Parvovirus Porcino, Leptospira canicola, Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira australis, Leptospira grippotyphosa, Leptospira pomona, Leptospira tarassovi.
 Suspensión inyectable

Composición:

Cada dosis contiene:

Erysipelothrix rhusiopathiae, Serotipo 2, Cepa M2	≥ 1 ppd ¹
Parvovirus Porcino, Cepa 014	≥ 65 U/mL
Leptospira canicola, Serovar Portland-Vere, Cepa Ca-12-000	≥ 1408 U ² /mL
Leptospira icterohaemorrhagiae, Serovar Copenhageni, Cepa Ic-02-001	≥ 105 U ² /mL
Leptospira australis, Serovar Bratislava, Cepa As-05-073	≥ 852 U ² /mL
Leptospira grippotyphosa, Serovar Dadas, Cepa Gr-01-005	≥ 324 U ² /mL
Leptospira pomona, Serovar pomona, Cepa Po-01-000	≥ 83 U ² /mL
Leptospira tarassovi, Serovar Gatuni, Cepa S1148/02	≥ 138 U ² /mL
Excipientes csp	2 mL
-Adyuvante: dl-α-tocoferil acetato	

¹ Dosis Protectora Cerdo

² Unidades ELISA

Indicaciones de uso:

Inmunización activa, para:

- Ayudar a prevenir los problemas reproductivos causados por Parvovirus Porcino y Leptospira pomona.
- Reducir los signos clínicos causados por *E. rhusiopathiae* y Leptospiras canicola y pomona.
- Reducir la infección causada por Leptospiras canicola, icterohaemorrhagiae, australis, grippotyphosa, pomona y tarassovi.
- Reducir la diseminación causada por Leptospira canicola.

Inicio de inmunidad:

- *E. rhusiopathiae*: 3 semanas
- Parvovirus Porcino: 10 semanas
- Leptospira: 2 semanas

FICHA TÉCNICA**Duración de inmunidad:**

- *E. rhusiopathiae*: 6 meses
- Parvovirus Porcino: 12 meses
- *Leptospira australis*: 6 meses
- *Leptospiras canicola*, *icterohaemorrhagiae*, *grippotyphosa*, *pomona* y *tarassovi*: 12 meses.

Especies de destino:

Cerdos, cerdas y chanchillas

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:**Dosis:**

2 mL.

Esquema de vacunación:

Administrar 2 dosis

- Primera dosis: 6 a 8 semanas previas de la fecha esperada de inseminación o monta.
- Booster: 4 semanas posterior a la primera dosis.

Revacunación:

- Cada 12 meses, con 1 sola dosis de Porcilis® Ery + Parvo + Lepto

Edad o peso

A partir de las 16 semanas de edad.

Condición fisiológica

Animales sanos.

Vía de administración

Intramuscular.

Modo de empleo:

Antes de usar, permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente.

Agitar bien antes de usar.

Administrar en forma aséptica.

Evitar la introducción de contaminación por aperturas múltiples.

Contraindicaciones:

Ninguna.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Se recomienda que seis meses después de la vacunación con Porcilis® Ery + Parvo + Lepto y de acuerdo a las condiciones sanitarias de la granja realizar una revacunación única con alguna vacuna contra Erisipela Porcina, para mantener la inmunidad contra *Erysipelotrix rhusiopathiae*.

Mantener fuera del alcance de los niños.

FICHA TÉCNICA**Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos o reacciones adversas:

Muy comúnmente puede ocurrir un aumento en la temperatura corporal hasta dos días después de la vacunación. El aumento promedio observado fue de 0,5°C (en casos individuales el aumento máximo fue 1,5°C). Reacciones locales transitorias, consistentes mayormente en hinchazón no doloroso, rojo, suave a duro son observaciones muy comunes. En general, las reacciones locales pueden tener un diámetro de ≤5 cm, en casos muy raros las reacciones locales en animales individuales pueden ser de hasta 20 cm de diámetro. Todas las reacciones locales desaparecen completamente dentro de aproximadamente 2 semanas después de la vacunación. En animales individuales reacciones sistémicas intermedias como vómito, enrojecimiento, respiración rápida y espasmos, pueden ser raramente observadas, las cuales resuelven en pocos minutos. En animales individuales reducciones transitorias en la ingesta de alimento o en la actividad pueden ocurrir muy poco comúnmente. La ingesta de alimentos y actividad son restablecidos completamente dentro de una semana.

En experiencia post comercialización:

Reacciones de hipersensibilidad pueden ocurrir en casos muy raros.

Período de resguardo:

Cero días.

Precauciones especiales para el operador:

En caso de auto-inyección accidental, buscar ayuda médica inmediatamente y mostrar el inserto del envase o la etiqueta al médico.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar refrigerado entre 2° y 8°C. No congelar. Proteger de la luz solar directa. Después de la primera apertura del envase primario, utilizar dentro de 10 horas.

Presentación:

Frasco conteniendo 10, 25, 50 o 125 dosis.

Fabricado por:

Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA



PORCILIS® Ery + Parvo + Lepto
Suspensión inyectable

FICHA TÉCNICA

Reg SAG N°2510-B