

## FICHA TÉCNICA

### EXPERT® PLUS

Diazinón 30% - Clorpirifos 10%

Arete

#### Composición:

Cada arete de 15 g contiene:

Diazinón	30% (equivalente a 4,5 g)
Clorpirifos	10% (equivalente a 1,5 g)
Excipientes c.s.p.	1 arete de 15 g

#### Indicaciones de uso:

Expert® Plus está indicado para el control de las infestaciones por la Mosca de los Cuernos (*Haematobia irritans*) en bovinos de carne y leche.

#### Especies de destino:


Bovinos.

#### Dosis:

Aplicar un arete por animal durante la época de primavera. Los aretes son eficaces por un periodo mínimo de 3-4 meses contra la Mosca de los Cuernos resistentes a piretroides, dependiente de la zona geográfica entre otros factores.

#### Vía de administración y modo de empleo:

Aplicar los aretes con el aplicador siguiendo las recomendaciones que se detallan a continuación. Tomar precauciones de higiene y asepsia a fin de minimizar el riesgo de infecciones en el punto de aplicación.



#### Contraindicaciones:

No aplicar en terneros menores de 3 meses para evitar daño en sus orejas.

#### Advertencias y precauciones especiales de uso:

Es necesario tratar todos los animales del rebaño al mismo tiempo.

Retire los aretes de los animales tratados una vez finalizada la temporada de moscas (abril o mayo), para minimizar la presentación de resistencia al insecticida.

Retirar los aretes de los animales antes de su sacrificio.

Mantener lejos del alcance de los niños.

## FICHA TÉCNICA

---

**Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

Ninguna conocida.

**Efectos o reacciones adversas:**

Ninguno conocido.

**Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:**

El producto puede ser aplicado en hembras gestantes y en lactancia.

**Período de resguardo:**

Carne y leche: Cero (0) días.

**Precauciones especiales para el operador:**

El producto es peligroso si es absorbido por la piel o es ingerido. Evitar el contacto con la piel y ojos. Después de usar el producto, lavarse las manos y otras partes del cuerpo expuestas con abundante agua. Si hubo contaminación en los ojos, lavar con abundante agua. Evite contaminar alimentos. Use guantes limpios cada vez que se aplican estos aretes. Contactos prolongados y/o repetidos con el producto pueden traer reacciones alérgicas en algunos individuos. Si se tragó o persiste la irritación de ojos o si aparece hipersensibilidad, consultar con el médico.

Diazinon y Clorpirifos son insecticidas organofosforados. Si aparecen síntomas de inhibición de colinesterasa, el antídoto de elección es el sulfato de atropina inyectable. 2-PAM también puede ser administrado como antídoto, pero solo en conjunto con sulfato de atropina.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener a temperatura ambiente, a menos de 25°C. No refrigerar ni congelar. Proteger de la luz solar directa. Las bolsas abiertas que contengan aretes en su interior deben ser reselladas para su almacenamiento.

**Presentación:**

Estuche conteniendo 20 aretes.

**Fabricado por:**

Y-TEX Corporation  
P.O. Box 1450  
1825 Big Horn Avenue,  
Cody, WY 82414-1450,  
Estados Unidos

**Importado y distribuido por:**

Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

**Bajo Licencia de Y-TEX Corporation, Estados Unidos**

**USO VETERINARIO**

**VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA**

**Reg SAG N°1561**