

FICHA TÉCNICA

KARSIVAN®
50 mg / 100 mg
Propentofilina 50 mg / Propentofilina 100 mg
Comprimido oral

Composición:

Cada comprimido de 50 mg / 100 mg contiene:

Propentofilina 50 mg / 100 mg

Excipientes c.s.p. 1 comprimido

Indicaciones de uso:

Para mejorar la circulación sanguínea periférica y cerebro-vascular en perros. Es particularmente útil en perros de edad avanzada, ya que alivia los típicos síntomas geriátricos.

Especies de destino:

Perros.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

La dosis diaria total es de 6-10 mg de propentofilina por kg de peso corporal. La cual debe ser dividida en dos dosis de 3-5 mg de propentofilina/kg de peso vivo cada 12 horas. Los comprimidos deben ser administrados de acuerdo a la siguiente tabla de dosificación:

Para comprimidos de 50 mg:

Peso corporal (kg)	Comprimidos		Total de comprimidos diarios	Dosis diaria total (mg/kg)
	AM	PM		
-4	¼	¼	½	6,3-10,0
5-8	½	½	1	6,3-10,0
9-15	1	1	2	6,7-11,1
16-25	1 ½	1 ½	3	6,0-9,4
26-33	2	2	4	6,1-7,7
34-50	3	3	6	6,0-8,8

Para comprimidos de 100 mg:

Peso corporal (kg)	Comprimidos		Total de comprimidos diarios	Dosis diaria total (mg/kg)
	AM	PM		
20-33	1	1	2	6,1- 10,0
34 - 49	1 ½	1 ½	3	6,1 - 8,8
50 - 66	2	2	4	6,1 - 8,0
67 - 83	2 ½	2 ½	5	6,0 - 7,5

Los comprimidos recubiertos pueden ser administrados directamente u ofrecidos para el consumo, ocultos en un trozo de comida, o partidos y mezclados con el alimento.

La duración del tratamiento será de 4 a 6 semanas, con control veterinario a las 2-4 semanas. La continuación del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario.

FICHA TÉCNICA

Contraindicaciones:

No se debe administrar a hembras gestantes o lactantes.
No administrar a animales hipersensibles a propentofilina.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Determinadas enfermedades (por ejemplo: enfermedad renal) deben ser tratadas acorde.
Se debe considerar la racionalización de la medicación de los perros que ya están recibiendo tratamiento para la insuficiencia cardiaca congestiva o enfermedad bronquial.
Si no se observa mejoría de los síntomas por deficiencia de irrigación hasta las 4 semanas, se debe suspender el tratamiento.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

En casos excepcionales pueden ocurrir reacciones alérgicas (por ejemplo: urticaria) y estos requieren la interrupción del tratamiento.
En perros viejos y debilitados pueden aparecer reacciones alérgicas.
Se ha observado vómito en raras ocasiones, particularmente al inicio del tratamiento.

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:

No se debe administrar a hembras gestantes o lactantes.

Período de resguardo:

No aplica.

Precauciones especiales para el operador:

Lávese las manos después del uso.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener a temperatura ambiente a menos de 25°C. No refrigerar ni congelar.

Presentación:

Estuche conteniendo 2 blisters de 30 comprimidos cada uno. Incluye inserto.
Estuche conteniendo 6 blisters de 10 comprimidos cada uno. Incluye inserto.

Fabricado por:

Intervet GmbH
Siemensstraße 107
AT – 1210
Viena, Austria



KARSIVAN®
Comprimido oral

FICHA TÉCNICA

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA.

Reg SAG N°2274 / 2305