

**FICHA TÉCNICA****PANACOXX®**Toltrazurilo 75 mg/mL, Fenbendazol 25 mg/mL  
Suspensión oral**Composición:**Cada 100 mL de suspensión contiene:

Toltrazurilo	7,5 g
Fenbendazol	2,5 g
Excipientes c.s.p	100 mL

**Indicaciones de uso:**

-Para el tratamiento y control de la eimeriosis en bovinos, causada por las principales especies de eimeria: E. bovis y E. zuernii, siendo también eficaz contra las especies E. alabamensis, E. canadenses, E. ellipsoidalis, E. bukidnonensis, E. subspherica, E. pellita, E. brasilensis, E. cylindrica, E. wyomingensis y E. auburnensis.

-Para tratamiento y control de los principales nemátodos gastrointestinales, tales como: Haemonchus spp. (L4), Cooperia pectinata, Cooperia spatulata, Trichostrongylus axei, Oesphagostomum radiatum, Trichuris discolor, Haemonchus placei y Cooperia punctata.

-Para la reducción de la eliminación de ooquistes de Eimeria spp. Y huevos de strongilideos en las heces de bovinos, disminuyendo la contaminación ambiental, que es la principal fuente de infección tanto para la eimeriosis como para los helmintos.

**Especies de destino:**

Bovinos: Terneros de hasta 12 meses.

**Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:**Dosis:

150 mg de Toltrazurilo y 50 mg de Fenbendazol por cada 10 kg de P.V. (equivalente a 2 mL de Panacoxx® por cada 10 kg de P.V.).

Frecuencia:

Dosis única.

Vía de administración:

Oral

Modo de empleo:

Agitar el frasco antes de usar.

**Contraindicaciones:**

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a los principios activos.

**Advertencias y precauciones especiales de uso:**

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.



## FICHA TÉCNICA

---

**Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

Ninguna conocida.

**Efectos o reacciones adversas:**

No se han descrito, siempre que sea administrado conforme a las recomendaciones del producto.

**Uso durante preñez, postura, lactancia y en animales reproductores:**

No administrar en gestación, lactancia ni en animales reproductores.

**Período de resguardo:**

Carne: 78 días.

No administrar a animales cuya leche sea destinada a consumo humano.

**Precauciones especiales para el operador:**

-Manipular el producto con mucho cuidado para evitar exposición, tomando todas las precauciones recomendadas.

-No comer, beber o fumar durante la aplicación.

-Lavar las manos con agua y jabón después de manipular el producto.

-Usar equipo adecuado de protección (guantes).

-Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de exposición accidental en la piel, lavar el área afectada con agua corriente y jabón. En casos de exposición accidental en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua limpia.

-En caso de síntomas de intoxicación debido a la exposición, buscar orientación médica de manera inmediata presentando la etiqueta del producto.

-En caso de ingestión accidental, lavar la boca con abundante agua. No inducir el vómito y procurar cuidados médicos inmediatamente.

-No hay antídoto conocido para el Fenbendazol y Toltrazurilo, en caso de intoxicación, el tratamiento deberá ser sintomático.

**Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar a menos de 30°C. No refrigerar ni congelar. Proteger de la luz solar.

**Presentación:**

Frasco conteniendo 250 mL del producto. Estuche con 1 frasco conteniendo 1 L del producto.

**Fabricado por:**

Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda.

Rua Coronel Bento Soares, 530-CEP 12730-340 – Cruzeiro

Sao Paulo – Brasil

**Importado y distribuido por:**

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

**Bajo Licencia de Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda., Brasil**



PANACOXX®  
Suspensión oral

## FICHA TÉCNICA

---

**USO VETERINARIO**  
**VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA**  
**Reg. SAG N°2589**