

FICHA TÉCNICA**CEFA-SAFE®**Tratamiento intramamario para vacas secas
Suspensión intramamaria**Composición:**Cada jeringa de 10 mL contiene:Cefapirina benzatina 383,3 mg
(equivalente a 300 mg de cefapirina base)

Excipientes c.s.p. 10 mL

Indicaciones de uso:

Tratamiento intramamario de infecciones subclínicas existentes y prevención de nuevas infecciones que pueden ocurrir durante el período de secado y que sean causadas por bacterias sensibles a cefapirina, tales como *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *A. Pyogens*, *E. coli* y *Klebsiella*.

Especies de destino:

Bovinos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:Dosis:

Cada cuarto es infundido con el contenido de una jeringa en el momento del secado.

Vía de administración:

Intramamaria.

Modo de empleo:

Antes de administrar Cefa-Safe®, ordeñe la ubre por completo. Limpie y desinfecte a fondo los pezones. Retire total o parcialmente el capuchón del extremo de la boquilla de la jeringa, dependiendo de que vaya a introducirla por entero o sólo en parte. Introduzca cuidadosamente la boquilla en el orificio del pezón e inyecte lentamente todo el contenido de la jeringa. Aplique un masaje suave para que la suspensión se disperse hacia el interior del cuarto. Aplique también un masaje cuidadoso en éste. Tratar todos los cuartos en el momento del secado.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con antecedentes a alergia a las cefalosporinas.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:

Puede ser utilizado durante la última etapa de la preñez.

No administrar en hembras en lactancia.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No utilizar en forma concomitante con preparaciones que contienen compuestos bacteriostáticos, ya que puede ocurrir antagonismo.

FICHA TÉCNICA

Efectos o reacciones adversas:

Reacciones alérgicas han sido observadas ocasionalmente.

Período de resguardo:

Carne: 14 días.

Leche: El último tratamiento debe realizarse al menos 33 días antes del parto. La leche no debe destinarse a consumo humano al menos 24 horas post parto.

Precauciones especiales para el operador:

Para prevenir alergia por contacto, las personas con antecedentes de alergia a cefalosporinas y/o penicilinas deben ser advertidas para evitar el contacto del medicamento con la piel.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente, por debajo de 25°C. No refrigerar ni congelar.

Presentación:

Estuche con 4 o 20 jeringas. Presentación de 20 jeringas incluye 20 toallitas de limpieza.

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N°: 1369-B