



NOBIVAC® FeLV
Suspensión inyectable

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® FeLV
Vacuna inactivada contra Leucemia felina
Suspensión inyectable

Composición:

Cada dosis contiene:

Virus Leucemia Felina, cepa Rickard $\geq 1,3$ RP

Excipientes c.s.p. 1 mL

-Preservantes: Gentamicina y Anfotericina B

Indicaciones de uso:

Nobivac® FeLV está indicada para la vacunación de gatos sanos, como una ayuda en la prevención de tumores linfoides causados por la infección del virus de la leucemia felina (FeLV), así como de enfermedades asociadas con la misma infección. La vacunación con este producto previene la viremia persistente en gatos que se han expuesto al virus virulento de la leucemia felina.

Especies de destino:

Gatos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis:

1 mL

Programa de vacunación:

Vacunación inicial: Inyecte 1 dosis subcutánea o intramuscularmente a las 9 o más semanas de edad.

Segunda vacunación: Inyecte 1 dosis subcutánea o intramuscularmente de 3 a 4 semanas después de la vacunación inicial.

Se requieren dos dosis para la inmunización primaria. Se recomienda revacunar cada dos años con una dosis.

Edad o peso:

A partir de las 9 semanas de edad.

Condición fisiológica:

Animales sanos.

Vía de administración:

Subcutánea o intramuscular.

Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar.

Administrar en forma aséptica.



NOBIVAC® FeLV
Suspensión inyectable

FICHA TÉCNICA

Contraindicaciones:

No vacunar hembras preñadas.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

No utilizar desinfectantes químicos para esterilizar jeringas y agujas.

Es importante tener en cuenta que ciertas condiciones y situaciones pueden ocasionar que algunos gatos no desarrollen ni mantengan una respuesta inmune adecuada aun después de la vacunación. En el caso de una exposición previa a la leucemia felina, la vacunación no alterara el curso de la enfermedad, como tampoco en el caso de la enfermedad tipo latente. Por consiguiente, antes de la vacunación de cualquier gato, se recomienda exámenes de diagnóstico de antígenos virales de la leucemia felina. Es importante informar al dueño del gato de estas situaciones antes de la vacunación.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos o reacciones adversas:

El uso de la vacuna puede producir reacciones anafilácticas y/u otras de hipersensibilidad mediada por procesos inflamatorios inmunes.

Antídoto: Los siguientes productos pueden ser aplicados, dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción: epinefrina, corticoides y antihistamínicos.

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:

No se recomienda vacunar durante preñez ni lactancia.

Período de resguardo:

No aplica.

Precauciones especiales para el operador:

Se deben tomar las precauciones normales asociadas a la manipulación de productos inyectables, para evitar la autoinyección accidental. En caso de inyección accidental del producto, buscar atención médica inmediata.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar refrigerado entre 2° y 8°C. No congelar. Proteger de la Luz.

Presentación:

Estuche conteniendo 1, 5, 10, 25 o 50 frascos de una dosis. Incluye inserto.

Fabricado por:

Intervet Inc. USA,
21401 West Center Road, Elkhorn, NE 68022
USA.



NOBIVAC® FeLV
Suspensión inyectable

FICHA TÉCNICA

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg SAG N°1630-B