



NOBIVAC® HCP
Polvo liofilizado

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® HCP

Vacuna viva contra Rinotraqueítis Infecciosa, Calicivirus y Panleucopenia Felina
Polvo liofilizado para reconstituir suspensión inyectable

Composición:

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Rinotraqueítis felino, cepa 593-J	≥ 10 ^{4.7} PFU
Calicivirus felino, cepa 894-T	≥ 10 ^{3.1} PFU
Virus Panleucopenia felino, cepa Philips Roxane	≥ 10 ^{3.0} FAID ₅₀
Excipientes c.s.p.	1 mL
- Preservante: Gentamicina	

Diluyente:

Agua estéril 1 mL

Indicaciones de uso:

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de enfermedades felinas causadas por los virus de la Rinotraqueítis infecciosa, Calicivirus y Panleucopenia Felina, Quantum® Cat HCP está indicada como una ayuda en la prevención de enfermedades felinas causadas por los virus de la Rinotraqueítis infecciosa, Calicivirus y Panleucopenia Felina, en gatos sanos a partir de las 9 semanas de edad.

Especies de destino:

Gatos.

Dosis:

1 mL

Esquema de vacunación:

Administrar 2 dosis, con un intervalo de 3-4 semanas.

Los gatos vacunados a las 12 semanas de edad o mayores requieren dos dosis con un intervalo de 3-4 semanas.

Se recomienda la vacunación anual con 1 dosis.

Edad o peso:

A partir de las 9 semanas de edad.

Condición fisiológica:

Animales sanos.

Vía de administración:

Intramuscular o subcutánea.

Modo de empleo:

Transfiera todo el contenido del frasco de diluyente al frasco de la vacuna liofilizada usando técnicas de asepsia habitual y agujas y jeringas estériles.

No utilizar desinfectantes químicos para esterilizar jeringas o agujas.



NOBIVAC® HCP
Polvo liofilizado

FICHA TÉCNICA

Agitar bien antes de usar.
Administrar en forma aséptica.

Vacunación combinada con Nobivac® FeLV, Reg. SAG N°1630-B

Transfiera todo el contenido de Nobivac® FeLV, suspensión inyectable, al frasco de la vacuna liofilizada usando técnicas de asepsia habitual y agujas y jeringas estériles.

La vacuna esta lista para su uso.

La dosis a aplicar corresponde a 1 mL siendo ese esquema de vacunación el mismo que cuando se aplica la vacuna no combinada.

Contraindicaciones:

No vacunar hembras preñadas.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No usar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos, salvo con Nobivac® FeLV, Reg SAG N°1630-B.

Efectos o reacciones adversas:

Ocasionalmente, se pueden presentar reacciones anafilácticas y/u otras de hipersensibilidad mediada por procesos inflamatorios inmunes.

Antídoto: Los siguientes productos pueden ser aplicados, dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción: epinefrina, corticoides y antihistamínicos.

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores:

No vacunar hembras preñadas.

Precauciones especiales para el operador:

Se deben tomar las precauciones normales asociadas a la manipulación de productos inyectables, para evitar la auto inyección accidental.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar refrigerado entre 2°C y 8°C. No congelar.

Presentación:

Estuche conteniendo 1, 5 o 25 frascos de polvo liofilizado (conteniendo 1 dosis de vacuna) y 1, 5 o 25 frascos de diluyente.

Fabricado por:

Intervet Inc.
21401 West Center Road, Elkhorn, NE 68022
USA.



NOBIVAC® HCP
Polvo liofilizado

FICHA TÉCNICA

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA

Reg SAG N°1382-B