



BRAVECTO® PLUS
Solución tópica

FICHA TÉCNICA

BRAVECTO® PLUS

Fluralaner 112,5 mg-Moxidectina 5,6 mg / Fluralaner 250 mg – Moxidectina 12,5 mg Fluralaner 500 mg – Moxidectina 25 mg
Solución tópica

Composición:

	Bravecto® Plus 112,5 mg	Bravecto® Plus 250 mg	Bravecto® Plus 500 mg
<u>Fluralaner (micronizado)</u>	112,5 mg	250 mg	500 mg
<u>Moxidectina</u>	5,6 mg	12,5 mg	25 mg
<u>Excipientes c.s.p</u>	0,40 mL	0,89 mL	1,79 mL

Indicaciones de uso:

Para gatos con o en riesgo de infestaciones parasitarias mixtas por pulgas y nematodos intestinales (larvas de 4to estado, adultos inmaduros y adultos de *Toxocara cati* y *Ancylostoma tubaeforme*). Este producto está indicado exclusivamente cuando se usa contra pulgas y uno o más de los otros parásitos de destino es indicado al mismo tiempo.

Para el tratamiento de infestaciones de pulgas en gatos entregando actividad de eliminación inmediata y persistente contra pulgas (*Ctenocephalides felis*) con actividad de eliminación por 12 semanas.

Las pulgas deben estar sujetas al huésped y comenzando su alimentación para ser expuestos a la sustancia activa.

Para el tratamiento de infestaciones por *Otodectes cynotis*.

El producto puede ser utilizado como parte de la estrategia de tratamiento contra la dermatitis alérgica a la pulga (DAPP).

Especies de destino:

Gatos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis

Las pipetas deben ser administradas de acuerdo con la siguiente tabla:

Peso corporal (kg) del Gato	Bravecto® Plus 112,5 mg	Bravecto® Plus 250 mg	Bravecto® Plus 500 mg
1,2– 2,8	1		
>2,8 – 6,25		1	
>6,25 – 12,5			1

Para gatos de más de 12,5 kg, usar la combinación de pipetas que se acerque más al peso corporal.

Vía de administración

Vía tópica.


FICHA TÉCNICA

Modo de empleo

Paso 1: Inmediatamente antes del uso, abrir el sachet y retirar la pipeta. La pipeta debe ser tomada por la base o por la porción superior rígida bajo la tapa en posición vertical (punta hacia arriba) para abrirla. La tapa "gira y usa" puede ser rotada en sentido del reloj o contra el sentido del reloj en una vuelta completa. La tapa se mantendrá en la pipeta; no es posible removerla. La pipeta está abierta y lista para la aplicación cuando se siente que el sello se rompió.

Paso 2: El gato debe estar de pie o acostado con la espalda horizontal para una fácil aplicación. Colocar la punta de la pipeta en la base del cráneo del gato.

Paso 3: Apretar la pipeta suavemente y aplicar el contenido completo directamente en la piel del gato. El producto debería ser aplicado en gatos de hasta 6,25 kg de peso corporal en un punto en la base del cráneo y en dos puntos en la base del cráneo en gatos de peso mayor a 6,25 kg.



Programa de tratamiento:

Para el control óptimo de infestación por pulgas, el producto debe ser administrado en intervalos de 12 semanas.

Los gatitos bajo 6 meses de edad deben ser pesados regularmente. El tratamiento debe ser adaptado apropiadamente por el veterinario para ajustarse a los cambios individuales de peso. Desde los 6 meses de edad, los gatos deben ser tratados en intervalos de 12 semanas.

Para el tratamiento concurrente de infecciones con nematodos gastrointestinales *T. catti* y *A. tubaeforme*, una dosis única del producto debe ser aplicada. La necesidad y frecuencia de un re-tratamiento debe ser según el consejo del Médico Veterinario que prescribe el medicamento y tomar en cuenta la situación epidemiológica local.

Contraindicaciones:

No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a cualquiera de los excipientes.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Se debe tener cuidado para evitar el contacto con los ojos del animal.

No usar directamente sobre lesiones de piel.

En la ausencia de datos disponibles, el tratamiento en gatitos menores de 9 semanas de edad y gatos de menos de 1,2 kg de peso corporal no es recomendada.

El tratamiento en animales reproductores machos no es recomendado.

El producto no debe ser administrado en intervalos más cortos que 8 semanas, ya que la seguridad de intervalos más cortos no ha sido evaluada.

El producto es para uso tópico y no debe ser administrado oralmente. La ingesta oral del producto en la máxima dosis recomendada de 93 mg de Fluralaner + 4,65 mg de Moxidectina/kg peso corporal induce algo de salivación autolimitante o incidencias de vomito único inmediatamente después de la administración.



BRAVECTO® PLUS
Solución tópica

FICHA TÉCNICA

Es importante aplicar la dosis como es indicada para prevenir que el animal se lama e ingiera el producto.
No permita que animales tratados recientemente se acicalen entre ellos.
No permita que animales tratados tomen contacto con animales no tratados hasta que el sitio de aplicación este seco.

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores:

No administrar en gatas preñadas o en lactancia, ni en gatos reproductores.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

Las lactonas macrocíclicas incluyendo Moxidectina han mostrado ser sustratos para glicoproteína p. Por ello, durante el tratamiento con Bravecto Plus, otros productos que pueden inhibir la glicoproteína p (por ej. Ciclosporina, ketoconazol, spinosad, verapamil) deberían ser utilizado concomitantemente solo según la evaluación riesgo-beneficio del Médico Veterinario responsable. La seguridad de su uso simultaneo de Bravecto® Plus y praziquantel (en dosis de 16,7 mg/peso corporal) ha sido confirmada.

Efectos o reacciones adversas:

Reacciones en piel leves y transitorias en el lugar de aplicación (alopecia, piel descamada y prurito) fueron observados en las pruebas clínicas (2,9% de los gatos tratados).

Las siguientes reacciones adversas fueron observadas en las pruebas clínicas muy pronto después de la administración: disnea después del lamido del sitio de aplicación, hematemesis, diarrea, letargia, hipersalivación, pirexia, taquipnea, midriasis (0,1% de los gatos tratados).

Período de resguardo:

No aplica.

Precauciones especiales para el operador:

Utilizar guantes para la administración del producto. Este producto es dañino después de la ingestión. Mantener el producto en el sachet hasta su uso, en orden de prevenir que niños tengan acceso directo al producto. La pipeta usada debe ser inmediatamente eliminada.

En caso de ingestión accidental, buscar ayuda médica inmediatamente y mostrar el inserto o etiqueta del envase al médico.

Este producto y la piel húmeda de un animal recientemente tratado puede ser levemente irritante a la piel y moderadamente irritante para los ojos. Evitar el contacto con piel, boca y/u ojos, incluyendo contacto mano a boca y/o mano a ojo. No comer, beber o fumar mientras de manipula el producto. No poner en contacto, o no permitir a los niños entrar en contacto con el sitio de aplicación hasta que este seco; por ello se recomienda tratar a los animales por la tarde. En el día del tratamiento, los animales tratados no se les debería permitir dormir en la misma cama que su dueño, especialmente niños.

Lavarse las manos con agua y abundante agua inmediatamente después del uso del producto. Si ocurre contacto con la piel, lavar el área afectada inmediatamente con agua. En algunos casos, el agua no es suficiente para remover el producto derramado en los dedos. Si residuos pegajosos persisten en la piel después de lavarla con agua, entonces puede ser removida utilizando artículos domésticos que contengan solventes orgánicos (por ejemplo, alcohol (etanol, alcohol isopropílico) o removedor de esmalte de uñas (acetona) aplicado suavemente con una torula.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener a temperatura ambiente a no más de 30°C. No refrigerar ni congelar.



BRAVECTO® PLUS
Solución tópica

FICHA TÉCNICA

Presentación:

Estuche conteniendo 1 pipeta. Incluye inserto.

Fabricado por:

Intervet Productions
Rue de Lyons, 27460 Igoville,
Francia

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N°: 2591-B / 2592-B / 2593-B