



SHUTOUT®



169979 R2

APROBADO
SAG
13 OCT 2023

Subnitrato de bismuto 2,6 g
Suspensión intramamaria

COMPOSICIÓN

Cada jeringa de 4 g contiene:

Subnitrato de bismuto 2,6 g
(equivalente a 1,9 g de Bismuto)
Excipientes c.s.p. 4 g

Especie de destino

Bovinos (vacas productoras de leche en secado).

Indicaciones de uso

Prevención de nuevas infecciones intramamarias durante el periodo seco.

En vacas consideradas libres de mastitis sub-clínicas, el producto puede ser usado por sí solo en el manejo de vacas en periodo de secado y control de mastitis.

Dosis

1 jeringa por pezón.

Frecuencia y duración del tratamiento

Dosis única.

Vía de administración

Vía intramamaria.

Modo de empleo


El producto tiene una boquilla de doble punta. La tapa de la jeringa puede ser removida parcial o totalmente.

Se recomienda pellizcar el pezón en la base para ayudar al posicionamiento de la pasta en la cisterna del pezón, sellando el canal desde la parte superior.


Opción punta corta: Esta opción permite una técnica de inserción parcial por lo que la jeringa solo necesita ser insertada en la punta del pezón.

Opción punta larga: Esta opción puede ser utilizada según conveniencia del tratamiento, por ejemplo, para prevenir la que la boquilla se salga del pezón debido al movimiento o en vacas nerviosas.

Paso 1: Retirar la tapa rompible.



Paso 2: Inserción larga o corta.



Infundir el contenido de una jeringa de producto en cada pezón inmediatamente después de la última ordeña de la lactancia (al inicio del periodo de secado). No masajear el pezón o ubre después de la infusión del producto.

Se deben tomar las precauciones para no introducir patógenos al pezón en orden de reducir el riesgo de mastitis post-infusión.

Es esencial limpiar cuidadosamente el pezón con las toallitas impregnadas de alcohol proporcionadas. Los pezones deben ser limpiados hasta que no se recolecte suciedad visible en la toalla. Se debe permitir que los pezones se sequen previo a la infusión.

Infundir asépticamente y tener cuidado para evitar la contaminación de la punta de la jeringa. Después de la infusión, es aconsejable utilizar un spray o dip en el pezón.

En condiciones ambientales frías, el producto debe ser calentado a temperatura ambiente en un ambiente cálido, para ayudar a su jeringabilidad.

Contraindicaciones

No usar el producto por sí solo en vacas con mastitis sub-clínicas en el periodo de secado.

No usar en vacas con mastitis clínicas en el periodo de secado. No utilizar en vacas lactantes.

No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

Efectos adversos y reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto farmacéutico tal como es indicado, así como las medidas a tomar cuando éstos se presenten

Ninguna conocida. Si observa cualquier efecto secundario, incluso aquellos no enumerados en este prospecto o si piensa que el medicamento no ha funcionado, informe a su veterinario.

Advertencias y precauciones especiales de uso

Es una buena práctica observar regularmente a las vacas en periodo de secado para signos de mastitis clínica. Si el cuarto sellado desarrolla mastitis clínica, se debe quitar el sello de forma manual previo a comenzar con una terapia apropiada.

Para reducir el riesgo de contaminación, no sumergir la jeringa en agua.

Usar la jeringa solo una vez. Es importante utilizar una técnica aséptica estricta para la administración de este producto ya que el producto no tiene actividad antimicrobiana.

No administrar con otro producto intramamario después de la administración del producto.

En vacas que puedan presentar mastitis subclínica, el producto puede ser utilizado después de la administración de un tratamiento antibiótico adecuado para vacas en periodo de secado en el cuarto infectado. No masajee el pezón o la ubre después de la infusión del producto.

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores

Preñez: El producto no es absorbido después de la infusión intramamaria, puede ser usado en animales preñados. Al momento de parto, el sello puede ser ingerido por el ternero. La ingestión del producto por el ternero es seguro y no produce efectos adversos.

Lactancia: El producto es indicado para uso en vacas en periodo de secado. Si accidentalmente es utilizado en una vaca en lactancia, se puede observar un aumento transitorio en el recuento de células somáticas (de hasta 2 veces). En este caso, retirar el sello manualmente, no son necesarias precauciones adicionales.

Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto farmacológico y sus posibles efectos en el animal tratado

En ensayos clínicos, la compatibilidad de una formulación de sellador de pezón conteniendo subnitrito de bismuto solo ha sido demostrada con preparaciones para vacas en periodo de secado conteniendo Cloxacilina.

Sobredosis

Se ha administrado el doble de la dosis recomendada a vacas y no se han observado efectos adversos clínicos.

Período de resguardo

Carne: Cero días.

Leche: Cero horas.

Precauciones especiales para el operador

Este producto puede causar irritación de piel y ojos. Evitar el contacto con piel y ojos. En caso de contacto con piel u ojos, lavar el área afectada con abundante agua. Las sales de bismuto han sido asociadas con reacciones de hipersensibilidad. Evitar el uso de este producto si es alérgico a sales de bismuto. Si se desarrollan síntomas después de la exposición, buscar atención médica y mostrar el inserto o etiqueta al médico. Lavarse las manos después de usar.

Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

Ninguna conocida.

Condiciones de almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente, a no más de 30°C. No refrigerar. No congelar.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho

Cualquier producto medicinal veterinario o material de desecho (incluyendo el sello utilizado) derivado desde este producto medicinal veterinario debe ser dispuesto según los requerimientos locales. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o en cursos de agua.

Venta bajo receta Médico Veterinaria

USO VETERINARIO

PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Fabricado/Elaborado por:

Intervet International GmbH, Unterschlessheim, Alemania.

Importado y distribuido por:

En Chile: Intervet Chile Ltda. Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda. **Reg. SAG N° 2561**

En Colombia: MSD Salud Animal Colombia S.A.S., Bogotá. **Reg. ICA No. 10991-MV**

En México: Intervet México S.A. de C.V., Av. San Jerónimo 369, Colonia La otra Banda, Alvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México. www.msd-salud-animal.com.mx
Reg. Q-0273-260

En Perú: Merck Sharp & Dohme Salud Animal Perú S.A. Av. Andrés Reyes 338, San Isidro, Lima 15046 RUC: 20372399687 **Reg. SENASA F.078.005.I.00008**

