

**FICHA TÉCNICA****SLICE®**Benzoato de emamectina 0,2%  
Polvo oral**Composición:**Cada 100 g de polvo contiene:

Benzoato de Emamectina	200 mg
Excipientes c.s.p.	100 g

**Indicaciones de uso:**

Benzoato de Emamectina es para ser administrado en especies salmonídeas, como, por ejemplo, salmones y truchas, para el control de especies parásitas de piojo de mar *Caligus rogercresseyi*.

**Especies de destino:**

Salmón y Trucha.

**Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:**Dosis:

50 mcg de Benzoato de Emamectina/Kg de peso vivo, administrado una vez al día durante 7 días consecutivos.

Vía de administración:

Slice® debe mezclarse con el alimento previo a ser peleteado.

Modo de empleo:

Para asegurar una correcta dosificación se debe considerar el consumo de alimento, según especie y etapa de desarrollo del animal a medicar, la proporción del alimento medicado en la ración diaria, frecuencia y duración del tratamiento. El consumo de alimento depende de la situación clínica del animal y de la época del año. Para calcular la cantidad de producto necesario a utilizar, se debe conocer la tasa de alimentación de los peces a tratar, respetando la dosis terapéutica indicada. Controlar la alimentación de los peces.

**Contraindicaciones:**

No utilizar en peces adultos destinados a reproducción.

**Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores**

No utilizar en peces adultos destinados a reproducción.

**Advertencias y precauciones especiales de uso:**

Mantener fuera del alcance de los niños.

**Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

**Efectos no deseados o reacciones adversas:**

A dosis recomendables no se producen efectos indeseados.

## FICHA TÉCNICA

---

**Período de resguardo:**

Los peces no deben ser tratados más de una vez dentro de los 60 días antes de la cosecha para el consumo humano.

**Precauciones especiales para el operador:**

Debe evitarse la inhalación de polvo y el contacto con los ojos. Usar máscara, guantes y ropa adecuada. Debe lavarse las manos después de manipular este producto.

**Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar en lugar seco entre 15° y 30° C. Mantener separado de alimentos y comestibles.

**Presentación:**

Bolsa de 2,5 kg de producto.

**Fabricado por:**

Intervet GesmbH Vienna  
Siemensstrasse 107 1210,  
Viena, Austria.

**Importado y distribuido por:**

Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.  
**Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda**

**USO VETERINARIO**

**VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA RETENIDA**

**Reg SAG N° 655**