

FICHA TÉCNICA**Invixa®**
Lufenurón 10%
Polvo Oral**Composición:**Cada Kg contiene:

Lufenurón	100 g
Excipientes c.s.p.	1000 g

Indicaciones de uso:

Para la prevención y control de infestaciones producidas por el piojo de mar, *Caligus rogercresseyi* en salmones de cultivo. Solo para ser administrado por vía oral, a través del alimento, previo a su traslado a centros de cultivo en mar. El producto podrá emplearse exclusivamente en instalaciones de agua dulce que tengan en funcionamiento un sistema de tratamiento de efluentes que permita la retención de sólidos suspendidos, de acuerdo con los requerimientos regulatorios vigentes.

Especies de destino:

Salmónidos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:Dosis, Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:

La dosis corresponde a 5 mg de lufenurón/Kg/día, para una dosis total de lufenurón de 35 mg/Kg en los peces tratados.

La concentración de Invixa® en el alimento debe ser ajustada proporcionalmente a la tasa de alimentación requerida para alcanzar la dosis total requerida. Por ejemplo, a una tasa de alimentación del 1% de la biomasa/día, la tasa de incorporación debiera ser 5 Kg de premezcla en 1000 Kg de alimento pre-traslado para entregar una concentración de 0,05% de lufenurón en el alimento. En ocasiones, cuando la tasa de alimentación es inferior a la esperada, el período de alimentación podría ser extendido de 7 días a un máximo de 14 días, para asegurar que los peces reciban la dosis terapéutica completa de 35 mg/Kg.

Vía de administración:

Oral.

Modo de empleo:

FICHA TÉCNICA

Lufenurón es agregado en la premezcla al 10%. El alimento medicado es preparado mediante la adición de la premezcla en alimentos comerciales para peces, utilizando revestimiento externo o revestimiento mediante vacío (top-coating/vacuum-coating). El alimento medicado que contiene Imvixa® debe ser preparado solamente en las instalaciones de empresas productoras de alimento para peces que estén autorizadas para producir alimento medicado, no en los centros de cultivo.

Para garantizar eficacia en la prevención y control de infestaciones producidas por el piojo de mar, se recomienda que Imvixa® sea usado de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- Uso del producto en ausencia de cualquier enfermedad concomitante o condición medioambiental que afecte el apetito.
- Medicación de una cantidad apropiada de alimento para asegurar un consumo completo y homogéneo.
- Asegure la administración de la dosis correcta durante un período mínimo de 7 días.
- Monitoreo de la alimentación de los peces durante su administración.
- Traslado de los peces al mar no antes de 7 días de finalizado el tratamiento.

Contraindicaciones:

No utilizar cuando los peces muestren signos clínicos de enfermedad o cuando no sea probable que se consuma la cantidad de alimento medicado necesario para alcanzar la dosis terapéutica de 35 mg/kg.

No utilizar para el tratamiento de salmónidos en instalaciones que no cuenten con un método eficaz de retención de sólidos suspendidos de acuerdo con los requerimientos locales y nacionales vigentes.

No usar en reproductores.

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Solo para uso animal.

No administrar el producto en centros de cultivo en mar o lagos.

Asegurar la adecuada administración en todos los peces del grupo mediante buenas prácticas de alimentación y no exceder la dosis de tratamiento recomendada.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No utilizar en forma concomitante con productos farmacéuticos.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

FICHA TÉCNICA

A la dosis recomendada, Imvixa® no produjo efectos no deseados durante los ensayos clínicos.

Período de resguardo:

Peces tratados no deben ser destinados a consumo humano por al menos 2050 grados día luego de finalizado el tratamiento con este producto veterinario.

Precauciones especiales para el operador:

Solo para uso animal.

Use guantes de protección, antiparras y mascarilla protectora mientras manipula el medicamento veterinario y el alimento medicado.

En caso de contacto accidental con los ojos o la piel, lave inmediatamente con agua.

En caso de ingestión accidental, busque ayuda médica inmediatamente.

No coma, beba o fume mientras manipula el medicamento veterinario y el alimento medicado.

Lávese las manos y la piel expuesta después de manipular el medicamento veterinario y el alimento medicado.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente, entre 15 – 30°C, en un lugar fresco y seco, en su envase original bien cerrado.

Presentación:

Presentación de 5 Kg cada una: Bolsa multicapa de 2,5 Kg al interior de un balde o 5 bolsas de 1 Kg al interior de un balde.

Presentación de 1 Kg: Bolsa multicapa de 1 Kg.

Fabricado por:

Elanco France
26, Rue de Chapelle
68330 Huninge
Francia.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile

Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.

USO VETERINARIO

FICHA TÉCNICA

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA RETENIDA
Reg. SAG N° 2325