

CIRCUMVENT® PCV
Suspensión Inyectable**FICHA TÉCNICA****CIRCUMVENT® PCV**

Vacuna subunitaria contra Circovirus Porcino Tipo 2
Suspensión Inyectable

Composición:Cada dosis contiene:

Antígeno subunitario ORF2, Circovirus Porcino tipo 2,
Cepa MSV-BAC/PCV2-ORF2; 98-99 1.2 mL/vial.24FEB03 $\geq 1,4$ RP
Excipientes c.s.p. 2 mL
Adyuvantes: Fortasol y Microsol
Preservantes: Timerosal y gentamicina

Indicaciones de uso:

Como ayuda en la prevención de la viremia y de la excreción del Circovirus Porcino tipo 2.

Especies de destino:

Cerdos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:Posología:

1 dosis de 2 mL. Revacunar a las 3 semanas.

Edad o peso:

A partir de las 3 semanas de edad.

Vía de administración:

Intramuscular

Modo de empleo:

Agitar antes de administrar, permita que alcance la temperatura ambiente
Administrar en forma aséptica
Mantener fuera del alcance de los niños

Contraindicaciones:

No vacunar durante gestación ni lactancia.

CIRCUMVENT® PCV
Suspensión Inyectable**FICHA TÉCNICA**

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Usar sólo en animales sanos.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos adversos y reacciones adversas:

Pueden presentarse reacciones leves en el sitio de inyección. Si se presentan reacciones anafilácticas, tratar con epinefrina.

Período de resguardo:

Cero (0) días.

Precauciones especiales para el operador:

Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección accidental pueden resultar en dolor severo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación o un dedo, y en casos raros, puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato.

Si usted es inyectado accidentalmente con este producto, busque atención médica de inmediato, aunque sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve el inserto interno con usted. Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque atención médica otra vez.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un sitio oscuro a una temperatura de entre 2- 8°C. No congelar.

Presentación:

Frasco conteniendo 100 mL equivalente a 50 dosis; 200 mL equivalente a 100 dosis o de 500 mL equivalente a 250 dosis. Incluye prospecto interno.

Fabricado por:

Intervet Inc. U.S.A
35500 West 91st Street, DeSoto, Kansas, USA.



CIRCUMVENT® PCV
Suspensión Inyectable

FICHA TÉCNICA

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N°: 2006-B