

FICHA TÉCNICA

LACTOTROPINA®
Somatotropina Bovina Zinc 500 mg
Suspensión inyectable

Composición:

Cada jeringa contiene:

Somatotropina Bovina Zinc 500 mg
Excipientes c.s.p. 1,4 mL

Indicaciones de uso:

Lactotropina® se utiliza para aumentar la producción de leche y eficiencia productiva en vacas lecheras sanas, en lactancia y en adecuadas condiciones nutricionales.

Especies de destino:

Bovinos de leche.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis, Frecuencia y Duración del tratamiento:

1 jeringa de Lactotropina® cada 14 días, comenzando la 9° semana después del parto, pudiendo extenderse su aplicación hasta 15 días antes del secado de la vaca.

Vía de administración:

Inyección subcutánea.

Modo de empleo:

- Agitar antes de usar.
- El sitio de inyección debe estar libre de suciedad.
- Los sitios recomendados para su aplicación son: área del cuello, región pos-escapular (área detrás del hombro), depresión ubicada a ambos lados de la base de la cola.
- En el caso que reciban dosis consecutivas se recomienda ir alternando el lado derecho e izquierdo del animal, para su aplicación.
- Inyecte el contenido completo vía subcutánea.

Contraindicaciones:

No han sido descritas.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- Permita que las jeringas alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes de su administración.
- Evite temperaturas altas y exposición a la luz solar.
- No inyecte en el pliegue caudal de la cola. Las estructuras que se deben evitar pueden localizarse fácilmente al levantar la cola del animal.

FICHA TÉCNICA

- Se debe tener cuidado para evitar el hueso, los músculos, tendones y tendones de la cola, así como los músculos anales y rectales.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Si el uso de Lactotropina® se interrumpió, se podrá continuar su aplicación más adelante en la lactación.
- Aumento marcado en la producción de leche asociado con una reducción de la tasa de preñez.
- El intervalo de parto se puede ver aumentado si la reproducción ocurre durante el periodo inicial de tratamiento.
- Se recomienda un buen manejo y nutrición para una óptima producción.
- La respuesta en la producción de cada vaca puede variar.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No hay interacción conocida hasta el momento.

Efectos o reacciones adversas:

Se puede desarrollar una inflamación temporal en el sitio de inyección.

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:

Lactotropina® puede ser usada en animales reproductores, preñados y en lactancia.

Período de resguardo:

Leche: 0 días.

Carne: 0 días.

Precauciones especiales para el operador:

- Evitar el contacto con la boca, piel y ropa.
- Lactotropina® es una proteína, por lo que su contacto frecuente con la piel puede ocasionar una reacción alérgica en ciertos individuos, por lo que se recomienda lavarse bien las manos y otras áreas de contacto con la piel, con abundante agua y jabón.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado: Entre 2 y 8°C. No congelar.

Presentación:

Cajas conteniendo 25 jeringas con 1,4 mL. Contiene inserto.

Fabricado por:

Union Agener, Inc.
1788 Lovers Lane, Augusta
Georgia 30901
E.U.A.

FICHA TÉCNICA

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago – Chile.

Bajo licencia de Union Agener, Inc., E.U.A.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA RETENIDA

Reg. SAG N°1856