



BRAVECTO® 1M Triple  
Comprimido masticable

## FICHA TÉCNICA

### BRAVECTO® 1M Triple

BRAVECTO® 1M Triple 0,4 g - BRAVECTO® 1M Triple 0,8 g - BRAVECTO® 1M Triple 1,6 g - BRAVECTO® 1M Triple 3,2 g - BRAVECTO® 1M Triple 4,8 g  
Comprimido masticable

#### Composición:

	Bravecto® 1M Triple 0,4 g	Bravecto® 1M Triple 0,8 g	Bravecto® 1M Triple 1,6 g	Bravecto® 1M Triple 3,2 g	Bravecto® 1M Triple 4,8 g
<u>Fluralaner</u>	50 mg	100 mg	200 mg	400 mg	600 mg
<u>Moxidectina</u>	0,125 mg	0,25 mg	0,50 mg	1,0 mg	1,5 mg
<u>Pirantel</u>	25 mg	50 mg	100 mg	200 mg	300 mg
<u>Excipientes c.s.p</u>	1 comprimido masticable	1 comprimido masticable	1 comprimido masticable	1 comprimido masticable	1 comprimido masticable

#### Indicaciones de uso:

Para perros con o en riesgo de infestaciones parasitarias mixtas por parásitos externos e internos. El medicamento veterinario está recomendado exclusivamente cuando está indicado el uso simultáneo contra garrapatas o pulgas y nemátodos gastrointestinales.

Tratamiento y control de infestaciones por garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) y pulgas (*Ctenocephalides felis*).

Tratamiento de infestaciones por estadios adultos de nemátodos gastrointestinales como *Ancylostoma spp.*, *Toxascaris spp.*, *Trichuris spp.* y *Toxocara spp.*

#### Especies de destino:

Perros.

#### Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

##### Dosis

Los comprimidos masticables se deben administrar de acuerdo con la siguiente tabla (correspondiente a una dosis de 10-20 mg de Fluralaner, 0,025 – 0,05 mg de Moxidectina y 5 – 10 de Pirantel, por kg de peso corporal).



**BRAVECTO® 1M Triple**  
Comprimido masticable

## FICHA TÉCNICA

Peso corporal del perro (kg)	Número y concentración del comprimido a administrar				
	Bravecto® 1M Triple 0,4 g	Bravecto® 1M Triple 0,8 g	Bravecto® 1M Triple 1,6 g	Bravecto® 1M Triple 3,2 g	Bravecto® 1M Triple 4,8 g
>2,5 – 5,0	1				
>5,0 – 10		1			
>10 – 20			1		
>20 – 40				1	
>40 – 60					1
>60	Utilizar la combinación de tabletas que más se aproxime al peso corporal del animal.				

Los comprimidos de Bravecto® 1M Triple no se deben partir o dividir. Para garantizar una dosificación correcta, debe determinarse el peso corporal con la mayor precisión posible. Una dosificación insuficiente podría dar lugar a un uso ineficaz y favorecer el desarrollo de resistencia.

### Vía de administración

Oral.

### Modo de empleo

Administrar Bravecto® 1M Triple en el momento de la administración. Bravecto® 1M Triple es un comprimido agradable al paladar, aceptado voluntariamente por la mayoría de los perros. Sin embargo, si el comprimido no se traga voluntariamente, puede administrarse con algo de comida o directamente en la boca. Durante la administración, debe observarse al perro durante unos minutos para confirmar la ingesta adecuada del comprimido.

### Esquema de tratamiento:

En el caso de las infestaciones por pulgas, garrapatas y nemátodos intestinales, la necesidad y la frecuencia de los nuevos tratamientos deben seguir la recomendación del médico veterinario, teniendo en cuenta tanto la situación epidemiológica local como el estilo de vida del animal.

### Pulgas y garrapatas:

Para un control eficaz de pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*), Bravecto® 1M Triple debe administrarse a intervalos de hasta 37 días.

El producto puede utilizarse como parte de una estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAP).



BRAVECTO® 1M Triple  
Comprimido masticable

## FICHA TÉCNICA

---

### Nemátodos gastrointestinales:

Para el tratamiento concomitante de las infestaciones por nemátodos gastrointestinales, se debe proporcionar una dosis única de Bravecto® 1M Triple. Para perros de más de 60 kg, se deben utilizar combinaciones adecuadas de comprimidos masticables.

### **Contraindicaciones:**

No utilizar en casos conocidos de hipersensibilidad a los principios activos del producto.

No administrar en cachorros de menos de 8 semanas (56 días) de edad y/o perros con un peso corporal inferior a 1,27 kg.

### **Advertencias y precauciones especiales de uso:**

Los parásitos necesitan alimentarse del huésped para quedar expuestos al fluralaner; por lo tanto, no se puede excluir por completo el riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por parásitos.

Para el tratamiento de las infestaciones por nematodos gastrointestinales, el médico veterinario debe evaluar la necesidad y la frecuencia de los nuevos tratamientos, así como la elección de la estrategia terapéutica.

El uso innecesario de medicamentos antiparasitarios o el uso que no cumpla con el inserto puede aumentar la presión de selección de parásitos resistentes o resultar ineficaz. La decisión de utilizar el producto debe basarse en la confirmación de la especie de parásito presente, la carga parasitaria o el riesgo de infestación, teniendo en cuenta los aspectos epidemiológicos y el propio animal, siempre con asesoría del médico veterinario.

Debe considerarse la posibilidad de que otros animales en el área puedan ser una fuente de reinfestación por pulgas, garrapatas o nematodos gastrointestinales. Por lo tanto, los demás animales que se encuentren en el mismo espacio deben ser tratados según sea necesario con un producto adecuado, según aconseje el médico veterinario.

El producto se tolera bien en perros con deficiencia de proteína 1 multirresistente (MDR1 -/-), como se demostró en un estudio de laboratorio tras la administración oral de 3 veces la dosis recomendada. Después de haber administrado 5 veces la dosis máxima recomendada, se observaron signos neurológicos transitorios (principalmente depresión).

La dosis recomendada debe observarse estrictamente en perros con una mutación en los genes MDR1 (-/-) con glicoproteína P no funcional, como los Collie y razas relacionadas.

El producto no debe administrarse a intervalos inferiores a 1 mes (30 días), puesto que no se ha comprobado la seguridad a intervalos más cortos.



BRAVECTO® 1M Triple  
Comprimido masticable

## FICHA TÉCNICA

En ausencia de riesgo de coinfección con ecto y endoparásitos, se debe utilizar un producto de menor espectro.

Utilizar con precaución en perros con epilepsia preexistente y en perros con antecedentes de trastornos neurológicos.

### Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores:

No utilizar el producto en hembras preñadas, hembras en lactancia y en animales reproductores, pues la seguridad del producto no ha sido estudiada en estos casos.

### Interacciones con otros productos farmacéuticos:

Se ha demostrado que las lactonas macrocíclicas, incluida la Moxidectina, son metabolizadas por la glicoproteína P. Por lo tanto, durante el tratamiento con Bravecto® 1M Triple, otros productos que son sustratos o inhibidores de la glicoproteína P (por ejemplo, Ciclosporina, Digoxina, Doxorrubicina, Ketoconazol, Spinosad) solo deben usarse de forma concomitante de acuerdo con la evaluación de riesgo/beneficio establecido por el médico veterinario responsable.

### Efectos o reacciones adversas:

Común (1 a 10 animales/100 animales tratados)	Desordenes del tracto digestivo (por ej. diarrea, emesis) <sup>1</sup>
Poco común (1 a 10 animales/ 1.000 animales tratados)	Letargia <sup>2</sup> , Hipersalivación <sup>1</sup> , Disminución del apetito
Muy raro (<1 animal/ 10.000 animales tratados, incluyendo reportes aislados)	Tremor muscular, ataxia, convulsión <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Leves y usualmente resuelven dentro de 1 día

<sup>2</sup> Leves y usualmente resuelven dentro de 2 días

<sup>3</sup> Pueden ser serios.

### Período de resguardo:

No aplica.

### Precauciones especiales para el operador:

Conservar el producto en su envase original hasta su empleo.

El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No comer, beber ni fumar durante su manipulación.

Evitar el contacto con los ojos. Si esto ocurre, lavar inmediatamente con agua.



BRAVECTO® 1M Triple  
Comprimido masticable

## FICHA TÉCNICA

---

Lavar las manos con abundante agua y jabón inmediatamente después de administrar el producto.

El producto puede irritar o sensibilizar la piel, en caso de que ello ocurra, consultar a un médico.

En caso de ingestión, NO inducir el vómito y consultar a un médico.

Llevar el estuche o inserto en los casos que se debe acudir al médico.

Manipular con precaución por personas con hipersensibilidad conocida a Fluralaner, Moxidectina o Pirantel.

### **Condiciones de almacenamiento:**

Conservar el producto en su envase original, en un lugar fresco y seco, por debajo de 30°C, protegido de la luz solar y fuera del alcance de niños y animales domésticos. No refrigerar ni congelar.

### **Presentación:**

Estuche con 1, 3 o 6 blíster conteniendo 1 o 2 comprimidos. Incluye inserto.

### **Fabricado por:**

Intervet Ges.m.b.H.  
Siemensstraße 107,  
1210 Viena  
Austria

### **Importado y distribuido por:**

Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

**Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.**

### **USO VETERINARIO**

**VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA**

**Reg. SAG N°: 2736-B / 2737-B / 2738-B / 2739-B / 2740-B**